

Priloga 1:

»Priloga 1: Tehnološka navodila za integrirano pridelavo poljščin

## 1. UVOD

Tehnološka navodila so namenjena pridelovalcem poljščin, ki so vključeni v postopek certificiranja Integrirane pridelave poljščin.

Ukrepi v tehnoloških navodilih so razdeljeni na naslednji način:

- **zahteve** – pridelovalec mora pri izvajanju integrirane pridelave upoštevati zahteve iz tehnoloških navodil. Če organizacija za kontrolo in certificiranje ugotovi neskladje, lahko pridelovalec to neskladje odpravi;
- **prepovedi** – če organizacija za kontrolo in certificiranje ugotovi, da pridelovalec krši prepovedi iz tehnoloških navodil pri izvajanju integrirane pridelave, zavrne izdajo certifikata ali razveljavi že izdani certifikat.

## 2. LOKACIJA

**Zahteve:**

- na določeni lokaciji se pridelujejo le vrste oziroma kultivarji poljščin, ki so primerni glede na klimatske značilnosti, možnosti dodatne oskrbe z vodo, lastnosti tal in reliefa.

## 3. OSKRBA TAL

**Zahteve:**

- v posameznem posevku se izvede mehansko zatiranje plevelov vsaj 1-krat z uporabo česal ali z drugimi načini mehanske obdelave tal;
- obdelava tal se izvede tako, da se preprečita zbitost tal ter nastajanje plazine. Če do tega pride, je treba izvesti ukrep poglobljanja ornice ali podrahljavanja;
- obdeluje se primerno vlažna tla, tako da se ohranja njena struktura (pomembno tudi pri globinskem rahljanju tal);
- v tleh, kjer je vsebnost humusa manjša od 2 % (preračuno na organsko snov iz skupnega C do 0,3 m oziroma do globine ornice) je treba na njivi pustiti vse žetvene ostanke ali sejati rastline za zeleno gnojenje ali prekrivne rastline ali vrniti na njivo odvzeto organsko snov v obliki organskih gnojil;
- na nagnjeni površini se obdelava tal izvede prečno na pobočje (preprečevanje erozije). Treba je stalno ohranjati strukturo tal, razen pozimi, ko se tla ne obdeluje;
- izdelane bilance hranil;
- primerna pH vrednost tal glede na teksturo tal in zahtevo poljščine (kislost ali bazičnost). Njive s pH vrednostjo pod 4,5 (močno kislja), kar ne velja za barjanska tla, ne morejo biti v sistemu integrirane pridelave, izjema so kmetijska gospodarstva, ki imajo skupno manj kot 25 % površin s pH vrednostjo pod 4,5. Če je tako, se izvede kalcifikacija tal v prvem letu vključitve v integrirano pridelavo oziroma v jesenskem času pred vključitvijo v integrirano pridelavo;
- mulčenje in zaoravanje žetvenih ostankov poljščin se izvede v jeseni, vendar ne v zamrznjena tla. Če se izvaja konzervirajoča obdelava tal je treba žetvene ostanke zdrobiti do velikosti, ki ne omogočajo preživetja gosenic koruzne vešče.

**Prepovedi:**

- obdelava zamrznjenih tal na več kot 30 % globine ornice;
- kurjenje žetvenih ostankov na njivi, kot so slama, koruznica itd.;
- nepokritost kmetijskih tal v spomladanskem in poletnem času.

#### 4. KOLOBAR

**Zahteve:**

- upoštevanje vpliva poljščine na preprečevanje pojava bolezni in škodljivcev in na neuravnoteženo bilanco hranil v tleh;
- izdelava načrta kolobarjenja skupaj z gnojilnim načrtom;
- v 5 letni kolobar so vključene vsaj 3 različne vrste enoletnih poljščin (oziroma krmnih rastlin in semenskih posevkov ali dve zelenjavnici v vsakem letu na isti njivi) ali dve enoletni poljščini in en večletni posevek (npr. detelje, deteljne - travne mešanice) ali ena poljščina in 4 leta lucerna.
- v kolobar, če se ne gnoji z živinskimi gnojili, je treba vključiti v obdobju 5. let vsaj 1- krat kot glavni posevek eno enoletno (enoletne zrnate stročnice in detelje) ali večletno metuljnico (večletne detelje) ali strniščni dosevek (dvoletne detelje ali deteljno-travna mešanica) ali prekrivni posevek (prezimni ali neprezimni) ali dosevek metuljnice;
- če kolobar vključuje več žit si ta sledijo v naslednjem zaporedju: navadna pšenica, ječmen, tritikala, rž, oves, pira (npr. pšenica in nato rž). Po dveh ali treh letih neprekinjenega pridelovanja se jih za enako obdobje ne sme pridelovati na isti njivi;
- prekrivne prezimne ali neprezimne rastline (facelija, gorjušica itd.) so obvezne na območjih vodne ali vetrne erozija ali v kolobarju, kjer je koruza zastopana več kot 50 %;
- koruza se seje na isto njivo dvakrat v treh letih, vendar nikoli 2-krat zaporedoma;
- v kolobarju pese in križnic se le-te med seboj (npr. križnica-pesa) ali same s seboj (npr. pesa - pesa) ne sme sejati. Na isto površino se jih lahko seje vsako tretje leto;
- poljščine, ki se same s seboj ne prenašajo (npr. oves, ogrščica, koleraba, ajda, krompir in grah) se seje oziroma sadi na isto površino največ vsako tretje leto. Črno deteljo in lucerno se seje na isto površino vsako tretjo ali četrto leto.

**Prepovedi:**

- zaporedno vrstenje glavnih posevkov posameznih poljščin in sorodnih rastlinskih vrst (isti rodovi), razen hmelja;
- zaporedno sajenje koruze na isto površino več kot 2-krat;
- sajenje pravih žit v zaporedju rž - oves - ječmen – pšenica (npr. oves in nato pšenica) ali same s seboj (npr. ječmen – ječmen).

#### 5. SORTIMENT

**Zahteve:**

- pridelava rastnim razmeram prilagojene sorte, ki zagotavljajo ekonomsko upravičljiv in kakovosten pridelek. Sorte morajo biti vključene v skupni katalog sort poljščin ali v slovensko sortno listo (npr. ajda, proso);
- pridelava tolerantnih oziroma odpornih sort poljščin na bolezni in škodljivce;
- pridelava manj zahtevnih sort poljščin glede dušika;
- pridelava sort pravih žit, ki imajo krajšo rastno dobo pri enakem pridelku;

**Prepovedi:**

- uporaba gensko spremenjenih sort;
- uporaba semena, ki ne ustreza predpisom o zdravstvenem varstvu rastlin.

#### 6. GNOJENJE OZIROMA PREHRANA RASTLIN

## 6.1 BILANCA HRANIL

### Zahteve:

- mejna vrednost letnega vnosa hranil z organskimi gnojili znaša 120 kg P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> ha<sup>-1</sup>, 300 kg K<sub>2</sub>O ha<sup>-1</sup> in 170 kg dušika ha<sup>-1</sup>;
- za načrtovanje bilance hranil je treba ob vsaki kontroli predložiti analizo tal (pH, humus, K<sub>2</sub>O, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) in izdelan načrt kolobarja z bilanco hranil za 5 let glede na odvzem z načrtovanimi pridelki in stopnje založenost tal s hranili;
- analizo tal je treba narediti za vsakih 5 let, pri tem se upoštevajo vse analize, ki so bile narejene za posamezno parcelo v obdobju 4. let pred tem, če je vsebnost hranil analizirana po AI metodi. Ena analiza tal velja za več manjših parcel do 5 ha, če gre za podoben tip tal, vlažnostne razmere parcele, nagib in zgodovino gnojenja;
- med rastjo rastlin se analizira rastlinski material na mikro-hranila (Fe, Cu, Co, Mn, Zn, Mo, B) in če je treba se gnoji s foliarnimi sredstvi oziroma ustreznimi mineralnimi gnojili. Za oceno rasti razmer in vizualna znamenja pomanjkanja mikro-hranil se potrebuje pisni nasvet svetovalca;
- bilanco hranil, vključno z bilanco dušika za vse njivske površine pripravi kmetijski svetovalec oziroma strokovno usposobljena oseba, ki ima izkušnje na tem področju;
- s spremembo kolobarja je treba dopolniti izračune bilance hranil.

### Prepovedi:

- prekoračitev mejne vrednost letnega vnosa hranil.

## 6.2 ODMERKI IN APLIKACIJA DUŠIKOVIH GNOJIL VKLJUČNO Z ORGANSKIMI GNOJILI

### Zahteve:

- pokriti je treba najmanj 25 % N z živalskimi gnojili ali s kolobarjem (metuljnice) ali z organskimi gnojili ali z žetvenimi ostanki ali z zelenim gnojenjem ali s prekrivnimi rastlinami;
- v letu pridelave je na 10 % njiv obvezna analiza rastlinam razpoložljivega dušika v tleh pred osnovnim gnojenjem koruze oziroma v začetnih razvojnih fazah pravih žit pred 1. dognojevanjem. Za preostali delež 1/5 njiv (skupno 20 %) se letno naredi še najmanj 10 % hitrih rastlinskih nitratnih, ob ustreznem svetovanju tudi klorofilmetrskih testov rastlin;
- z N se ne dognojuje pri mejni vrednosti 21 mg NO<sub>3</sub>-N kg<sup>-1</sup> tal do 0,3 m globine tal oziroma okoli 75 kg nitratnega N ha<sup>-1</sup>-mineralne oblike;
- ciljne vrednosti in odmerke za gnojenje posameznih poljščin, je treba na podlagi izvedenih meritev (mineralnega NO<sub>3</sub>-N ali skupnega N<sub>min</sub> = NO<sub>3</sub>-N, NH<sub>4</sub>-N v tleh ali rastlinske nitratne teste ali druge analize) pridobiti s strani ustrezne strokovne službe. Vzorce na analizo dušika v tleh je treba ob odvzemu shraniti v ohlajeni hladilni torbi in nato pri temperaturah nižjih od 0 °C. Če se vzorce hrani več kot en dan jih je treba zamrzniti;
- v letu pridelave je treba na 10 % njiv za drugo in tretje dognojevanje pravih žit uporabiti rezultate hitrih rastlinskih nitratnih testov;
- kompost iz lastne pridelave je treba skladiščiti tako, da ne prihaja do odtekanja izcedkov v podtalnico;
- biološki razgradljivi odpadki se uporabljajo v skladu s predpisom, ki ureja predelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta ali digestata;
- upoštevati je treba uravnoteženo in potrebam prilagojeno oskrbo posevkov s hranili (še posebej z dušikom), da se ne poveča občutljivost posevkov na okužbo s škodljivimi organizmi in na poleganje;
- aplikacija mineralnih gnojil pri okopavinah se izvede v vrste, zadelovanje lahko topnih mineralnih gnojil pa v tla (npr. uree);
- treba je deliti obroke za gnojenje z N pri potrebah nad 80 kg/ha;

- odmerek dušika ne sme presegati vrednosti predpisanih v predpisu, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, kljub temu, da ciljne vrednosti za doseganje največjih pridelkov pri posameznih poljščinah presegajo te vrednosti.

**Prepovedi:**

- raznašanje N gnojil izven rastne dobe.

**7. NAMAKANJE****Zahteve:**

- na pridelovalnem območju, z organizirano ustrezno službo, je treba upoštevati uradne napovedi o namakanju;
- za namakanje je treba voditi zapise o uporabljeni namakalni normi in datumih namakanja;
- obroke vode je treba prilagoditi razvojni fazi rastlin, tipu tal ter vremenskim razmeram. Skupna mesečna količina porabljene vode ne sme preseči dolgoletne povprečne vsote padavin namakanega območja za več kot 50 %;
- na večjih namakalnih sistemih je obvezna predhodna organiziranost namakanja;
- sistem fertigacije (vnos gnojil in FFS s sistemom namakanja) je dovoljen le s strokovno pomočjo svetovalcev (v pisni obliki);
- vsebnost hranilnih snovi v vodi za namakanje je treba upoštevati v bilanci gnojenja (analiza vsebnosti dušika (nitrata) v vodi za namakanje), če je presežena mejna vrednost za pitno vodo 50 mg nitratov/l vode.

**Prepovedi:**

- obroki vode nad 20 mm, razen v primeru dokazljivih povečanih potreb največ 30 mm.

**8. SPRAVILO IN SKLADIŠČENJE****Zahteve:**

- vodenje evidence o skladiščenju pridelka tako, da je mogoč nadzor in sledenje pridelane količine.

**9. VARSTVO POLJŠČIN PRED BOLEZNIMI IN ŠKODLJIVCI****Zahteve:**

- izvajalec varstva rastlin mora biti ustrezno strokovno usposobljen o rabi FFS, kar se dokazuje s potrdilom o pridobitvi znanj iz fitomedicine;
- za aplikacijo FFS se uporabljajo tehnično brezhibne in redno pregledane naprave za nanos FFS;
- za zatiranje plevelov je treba v glavnih posevkih izvesti vsaj en ukrep brez kemične aplikacije letno (slepa setev, uporaba česal, okopavanje, termično zatiranje-plamen, vodna para itd.) ali aplikacijo herbicida v vrste;
- redno spremljanje pojava in razvoja škodljivih organizmov;
- za zatiranje škodljivih organizmov se izbere metoda varstva rastlin na podlagi lastne presoje in izkušenj ob upoštevanju prognostičnih obvestil Javne službe zdravstvenega varstva rastlin;
- pri odločanju za izvedbo ukrepov varstva rastlin je treba upoštevati pragove škodljivosti za škodljive organizme za poljščine, če ti pragovi obstajajo;
- vodenje evidence o uporabi FFS v kmetijski pridelavi ter izvajanju metod z nizkim tveganjem;
- izbrati je treba primeren rok setve in sajenja, da se ne pospešuje razvoja škodljivih organizmov in združevati je treba nekemične in kemične oblike varstva rastlin;

- izvajati je treba ustrezno oskrbo za posamezna rastišča in razmere, vključno s higienskimi ukrepi, ki zagotavljajo zdrave posevke in preprečujejo razširjanje plevelov v okolici;
- s ukrepi je treba zadrževati škodljive organizme pod pragom gospodarske škodljivosti, oziroma le-te kemično zatirati, šele ko je dosežen gospodarski prag škodljivosti;
- upoštevati je treba vrsto rastline in rastne razmere ter specifične značilnosti za nadaljnji razvoj škodljivih organizmov, izkušnje iz prejšnjih let in napovedi Javne službe zdravstvenega varstva rastlin;
- uporaba ustreznega FFS, registriranega za izbrano rastlino in škodljivi organizem. Uporabi se najnižji predpisan odmerek, potreben za specifične rastne razmere, škodljive organizme, razvojno fazo rastlin in škodljivih organizmov;
- razvoj odpornosti škodljivih organizmov je treba upočasniti z menjavanjem pripravkov, ki vsebujejo aktivne snovi z različnimi načini delovanja ter upoštevanjem največjega dovoljenega števila tretiranj in časovni interval med njimi.

**Prepovedi:**

- uporaba FFS, ki ni skladna s tem pravilnikom;
- prekoračene največje dovoljene mejne vrednosti ostankov FFS ali prisotnost nedovoljene aktivne snovi v odvzetem vzorcu.

**UPORABA FFS, KI JIM V LETU PRIDELAVE POTEČE ODLOČBA O REGISTRACIJI ALI BODO NA NOVO REGISTRIRANA PO OBJAVI TEHNOLOŠKIH NAVODIL V SLOVENIJI****Zahteve:**

- uporabljajo se FFS, ki so navedena v tej prilogi. Sredstva, ki so navedena v prilogi in jim med letom poteče registracija, pridelovalec lahko uporablja do zaključka rastne dobe, razen v primeru, če drugače ne odredi Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin;
- novi FFS, ki se na trgu pojavijo po izdaji te priloge, se lahko v letu registracije uporabljajo skladno s pogoji registracije in navedbami v navodilu za uporabo novega FFS, četudi ti FFS niso navedeni v tej prilogi.

**Uporaba rastnih regulatorjev****Zahteva:**

- uporaba rastnih regulatorjev ni dovoljena.

## 10. INTEGRIRANO VARSTVO POLJŠČIN

Sredstva, označena z zeleno barvo, so dovoljena v ekološki pridelavi.

Opombe: ČU – čas uporabe, VVOI- najože vodovarstveno območje (upoštevati predpise s področja varovanja virov pitne voda).

## 10.1 INTEGRIRANO VARSTVO ŽIT PRED BOLEZNIMI IN ŠKODLJIVCI

Opombe: j - ječmen; o - oves; pi - pira; p – pšenica; r - rž; t - tritikala;

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	UKREPI	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L ali kg na ha)	KARENCA (dni)	OPOMBE, dovoljeno št. rab
Pšenična listna pegavost ( <i>Zymoseptoria tritici</i> ) in Rjavenje pšeničnih plev ( <i>Parastagonospora nodorum</i> [ <i>Septoria nodorum</i> ])	<b>Agrotehnični ukrepi:</b> - preprečevanje razvoja samosevcev na strniščih, - ustrezna obdelava žetvenih ostankov, - setev manj občutljivih sort, - izolacija med jarimi in ozimnimi posevki.	azoksistrobin	Amistar (p, j, r, t) B	1 L/ha	35	2x/sezono
			Chamane (p) A	1 L/ha	35	2x/sezono
			Mirador 250 SC (p, j, r, t) B	1 L/ha	35	2x/sezono
			Norios (p) A	1 l/ha	35	2x/sezono
			Ortiva (p, j, r, t) B	1 L/ha	35	2x/sezono
			Tazer 250 SC (p) A	0,8 L/ha	35	2x/sezono
			Velostar (p) B	1 L/ha	ČU	2x/sezono
			Zafra AZT 250 SC (p, j, r, t) B	1 L/ha	35	2x/sezono
			Zoxis 250 SC (r, p, t) C	1 L/ha	35	2x/sezono
		azoksistrobin * difenokonazol	Amistar gold (p)	1 L/ha	ČU	1x/sezono; zmanjševanje okužb
		azoksistrobin + tebukonazol	Mirador forte (p-A; t,j-C)	1,5 – 2 L/ha	35	2x/sezono
		benzovindiflupir	Eliatus Plus (p, pi - A ; t-C)	0,75 L/ha	42	1x/sezono
		benzovindiflupir + protiokonazol	Eliatus Era (p, pi - A ; t-C)	1 L/ha	42	1x/sezono

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	UKREPI	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L ali kg na ha)	KARENCA (dni)	OPOMBE, dovoljeno št. rab
		biksafen + tebukonazol	Zantara (p, t) A	1,5 L/ha	35	1x/sezono
		biksafen + fluopiram + protiokonazol	Ascra xpro (p, t) A	1,5 L/ha	ČU	2x/sezono
		biksafen + protiokonazol	Siltra xpro (p,t) C	1 L/ha	ČU	2x/sezono
		biksafen + spiroksamin + trifloksistrobin	Cayunis (p, t) A	1 L/ha	ČU	2x/sezono
		boskalid + krezoksim-metil	Empartis (p, t, o) C	1,5 L/ha	56	2x/sezono
		difenokonazol	Greteg (p, pi, t) C	0,5 L/ha	40	1x /sezono
		difenokonazol + fluksapiroksad	Brivela (p) C	1,5 L/ha	56	1x /sezono
		difenokonazol + tebukonazol	Magnello (p) A	1 L/ha	ČU	1x /sezono
		fluksapiroksad	Imtrex XE (p, t) C	2 L/ha	ČU	2x/sezono
		fluksapiroksad + piraklostrobin	Priaxor EC (p, t) C	1,5 L/ha	35	2x/sezono
		fluksapiroksad + piraklostrobin	Mizona (p,pi) C	1 L/ha	35	2x/sezono <b>Zaloge v uporabi do: 31.7.2025</b>
		fluksapiroksad + mefentriflukonazol	Revytrex (p,t) C	1,125 L/ha	35	2x/sezono
		fluksapiroksad + metkonazol	Librax (p, t) C	1,33 – 2 L/ha		2x/sezono <b>Zaloge v uporabi do: 28.10.2025</b>
		mefentriflukonazol	Revystar (p, pi, t) C	1,5 L/ha	35	2x/sezono
		mefentriflukonazol + fluksapiroksad	Revystar XL (p, t) C	0,75-1,5 L/ha	35	2x/sezono
		mefentriflukonazol+ piraklostrobin	Revyicare (p, t) C	1,5 L/ha	35	2x/sezono
		mefentriflukonazol + krezoksim-metil	Duet turbo	1,0 L/ha	35	2x/sezono
		metkonazol	Caramba (p, t) C	1,5 L/ha	35	2x/sezono

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	UKREPI	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L ali kg na ha)	KARENCA (dni)	OPOMBE, dovoljeno št. rab
			Metso (p) C	1,5 L/ha	35	2x/sezono
			Plexeo (p, t) C	1,5 L/ha	35	2x/sezono
			Sirena (p, t) C	1,5 L/ha	35	2x/sezono
		prokvinazid + protiokonazol	Verben (p,t) C	1 L/ha	35	1x /sezono
		protiokonazol	Cactai (p, t) C	0,65 L/ha	ČU	2x/sezono
			Era (staro ime Tartaros 300 EC) (p, t) C	0,65 L/ha	ČU	2x/sezono
			Pecari 300 EC (p, t) A	0,65 L/ha	35	2x/sezono
			Praktis (p) C	0,8 L/ha	35	2x/sezono
			Procer 300 EC (p, t) C	0,65 L/ha	ČU	2x/sezono
			Promino 300 EC (p, t) C	0,65 L/ha	ČU	2x/sezono
			Protendo 300 EC (p, t) A	0,65 L/ha	35	2x/sezono
			Tartaros (p, t) C	0,65 L/ha	ČU	2x/sezono
		protiokonazol + spiroksamin	Input (staro ime Prosaros plus) (p, o, t) C	1,25 L/ha	42	1x /sezono
		protiokonazol + spiroksamin + trifloksistrobin	Delaro Forte (p-A, t-C)	1,2-1,5 L/ha	42	2x/sezono
		protiokonazol + tebukonazol	Prosaros (p, t) A	1 L/ha	35	1x /sezono
		tebukonazol	Bounty (p, t) C	0,6 L/ha	35	2x/sezono
			Buzz Ultra DF (p) C	0,33 kg/ha	35	2x/sezono
			Orius 25 EW (p) C	1 L/ha	ČU	2x/sezono
			Tebusha 25% EW (p, t) B	1 L/ha	35	2x/sezono
		tetrakonazol	Eminent 125 EW (p) A	1 L/ha	35	1x /sezono
		folpet	Folpan 500 SC	1,5 L/ha	ČU	2x/sezono
		žveplo	Vertipin (p)	7 L/ha	4	2x/sezono
		<i>Pythium oligandrum</i>	Polyversum (p, j, t, r, o) A	0,1 kg/ha	1	3x/sezono
		<p><b>OPOMBE:</b> A - registrirano za zatiranje pšenične listne pegavosti in rjavenja pšeničnih plev.  B - registrirano samo za zatiranje rjavenja pšeničnih plev  C - registrirano samo za zatiranje pšenične listne pegavosti</p>				

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	UKREPI	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L ali kg na ha)	KARENCA (dni)	OPOMBE, dovoljeno št. rab
	<p><b>Tehnika zatiranja:</b></p> <p>V obdobju med kolenčenjem in cvetenjem žit (BBCH 31 – 61) redno pregledujemo posevke. Kadar je potrebno izvedemo eno do dve, izjemoma tri aplikacije fungicidov, odvisno od stanja v posevku in okoljskih razmer. Za razvoj bolezní so nevarna predvsem nekajdnevna deževna obdobja, ko je listje mokro več ur.</p> <p><b>Prag škodljivost</b> je presežen, če je v obdobju med 2. kolencem in pojavom zastavičarja (BBCH 32 do 37) od 20 do 30 % rastlin z znamenji okužb na četrtem najmlajšem listu. Ali, če je v razvojni fazi od razvitega zastavičarja do začetka cvetenja (BBCH 39 do 61) 10 do 20 % rastlin z bolezenskimi znamenji. Drugo škropljenje se izvede glede na padavinske razmere. Potrebno ga je izvesti, če po prvem škropljenju pride obdobje z nekajdnevnimi obilnejšimi padavinami. Škropljenje se izvede po preteku dveh do treh tednov od predhodnega škropljenja.</p> <p><b>Agrotehnični ukrepi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- preprečevanje razvoja samosevcev na strniščih,</li> <li>- ustrezna obdelava žetvenih ostankov (zaoravanje, mulčenje..),</li> <li>- setev manj občutljivih sort,</li> <li>- izolacija med jarimi in ozimnimi posevki,</li> <li>- zmerno gnojenje z dušikom,</li> <li>- širok kolobar,</li> <li>- primerna gostota posevka,</li> <li>- ne prezgodnja setev ozimin,</li> <li>- setev manj občutljivih sort.</li> </ul> <p>Če je presežen prag škodljivosti izvedemo zatiranje s fungicidom.</p>	azoksistrobin	Chamane (j, r, t, o)	1 L/ha	35	2x/sezono
<b>Žitna pepelovka</b> ( <i>Blumeria graminis</i> )			Norios (j, r, t, o)	1 L/ha	35	2x/sezono
			Tazer 250 SC (p)	0,8 L/ha	35	2x/sezono
		azoksistrobin + tebukonazol	Mirador forte (p, j, t)	1,5 – 2 L/ha	35	2x/sezono
		biksafen + tebukonazol	Zantara (p, j, t, r, o)	1,5 L/ha	35	1x/sezono
		biksafen + fluopiram + protiokonazol	Ascra xpro (p, r, t, j, o)	1,2 (j, o) L/ha	ČU	1x /sezono
		biksafen + protiokonazol	Ascra xpro (p, r, t, j, o)	1,5 (p, r, t) L/ha	ČU	p, r, t- 2x/sezono
		biksafen + protiokonazol	Siltrax xpro (p, t, j, r, o)	1 L/ha	ČU	2x/sezono
		biksafen + spiroksamin + trifloksistrobin	Cayunis (p, j, t, r)	1 L/ha	ČU	2x/sezono
		boskalid + krezoksim-metil	Empartis (p, t, o)	1,5 L/ha	56	2x/sezono
		difenokonazol + fluksapiroksad	Brivela (p)	1,5 L/ha	56	1x /sezono
		fenpropidin	Tern (p)	0,75 L/ha	35	1x /sezono
		fluksapiroksad + mekonazol	Imtrex XE (p, j, r, t, o)	2 L/ha	ČU	2x/sezono
		meconazol	Librax (p, j, t)	1,33 - 2 L/ha	35	2x/sezono
	mefentriflukonazol	Revystar (p, pr, o)	1,5 L/ha	35	<b>Zaloga v uporabi do: 28.10.2025</b> 2x/sezono	

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	UKREPI	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L ali kg na ha)	KARENCA (dni)	OPOMBE, dovoljeno št. rab
		mefentriflukonazol + fluksapiroksad	Reyvistar XL (t)	1,5 L/ha	35	2x/sezono
		mefentriflukonazol + piraklostrobin	RevyCare (o)	1,5 L/ha	35	2x/sezono
		metrafenon	Flexity (p, j, o)	0,5 L/ha	35	2x/sezono <b>Zaloga v uporabi do: 29.10.2025</b>
		piraklostrobin + fluksapiroksad	Priaxor EC (p,j,t)	1,5 L/ha	35	2x/sezono
		krezosim- metil+mefentrifluko nazol	Duett turbo	1,0 L/ha	35	2x/sezono
		prokvinazid + protiokonazol	Verben (p,r,t)	1 L/ha	35	1x /sezono
		protiokonazol	Pecari 300 EC (p, j, r, t)	0,65 L/ha	35	2x/sezono
		protiokonazol + spiroksamin	Protendo 300 EC (p, j, r, t)	0,65 L/ha	35	2x/sezono
		protiokonazol + spiroksamin + trifloksistrobin	Input (staro ime Proसारo plus) (p, j, o, t)	1,25 L/ha	42	1x /sezono
		protiokonazol + tebukonazol	Delaro Forte (p, j, r, t)	1,2-1,5 L/ha	42	2x/sezono
		tebukonazol	Prosaro (p, j, r, t)	1 L/ha	35	1x /sezono
			Bounty (p, j)	0,6 L/ha	35	2x/sezono
			Buzz Ultra DF (p)	0,33 kg/ha	35	2x/sezono
			Folicur EW 250 (p, j, o, r)	1 L/ha	42	2x/sezono
			Orius 25 EW (j, p, r, t)	1 L/ha	ČU	2x/sezono
			Tebusha 25% EW (p, j, r, t)	1 L/ha	35	2x/sezono
		tetrakonazol	Eminent 125 EW (p)	1 L/ha	35	1x /sezono
		žveplo	Cosan (p, j, t, r)	5 – 7,5 kg/ha	35	2x/sezono
			Kumulul DF (p, j, t, r)	5-7,5 kg/ha	35	2x/sezono
			Microthiol dispers (p, j, t, r)	5 – 7,5 kg/ha	35	2x/sezono
			Microthiol SC (p, j, r, t)	5 – 7,5 L/ha	35	2x/sezono
			Microthiol special (p, j, r, t)	5 – 7,5 kg/ha	35	2x/sezono

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	UKREPI	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L ali kg na ha)	KARENCA (dni)	OPOMBE, dovoljeno št. rab
			Pepelin (p, j, r, t)	5 - 7,5 kg/ha	35	2x/sezono
			Sulfar (p, j, t, r)	5 - 7,5 kg/ha	35	2x/sezono
			Thiovit jet (p, j, t, r)	5 - 7,5 kg/ha	35	2x/sezono
			Vertipin (p, j, o, t)	6 L/ha	35	2x/sezono
			Vindex 80 WG (p, j, t, r)	5 - 7,5 kg/ha	35	2x/sezono
<b>Tehnika zatiranja:</b> V obdobju med kolenčenjem in cvetenjem žit (BBCH 32 – 61) redno pregledujemo posevke.						
<b>Prag škodljivosti</b> določimo tako, da po diagonalni prehodimo njivo in pobereмо 40 bili. Na vsaki pregledamo zgornje tri odвите liste in preštejemo rastline z bolezenskimi znamenji. Prag zatiranja je presežen, če ima 50-60 % rastlin znamenja pepelovke.						
Ječmenov listni ožig ( <i>Rhynchosporium secalis</i> ) in Ječmenova mrežasta pegavost ( <i>Pyrenophora teres</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- setev zdravega (certificiranega) semena,</li> <li>- setev manj občutljivih sort, hitro in temeljito zaoravanje žetvenih ostankov,</li> <li>- izolacija med jarimi in ozimnimi posevki,</li> <li>- ne sejati ječmena za ržjo.</li> </ul>	azoksistrobin	Amistar (p, j, r, t) C	1 L/ha	35	A – registrirano za zatiranje obeh boleznih
			Chamane (j) A	1 L/ha	35	B - registrirano za zatiranje ječmenove mrežaste pegavosti
			Mirador 250 SC (j, p, r, t) C	1 L/ha	35	C- registrirano za zatiranje ječmenovega listnega ožiga
			Norios (j) A	1 L/ha	35	
			Ortiva (p, j, r, t) C	1 L/ha	35	
			Tazer 250 SC (j) A	0,8 L/ha	35	
			Velostar (j) C	1 L/ha	ČU	
			Zafra AZT 250 SC (p, j, r, t) C	1 L/ha	35	
			Zoxis 250 SC (j) A	1 L/ha	35	
		azoksistrobin + tebukonazol	Mirador forte (j) B	1,5 -2 L/ha	35	
		benzovindiflupir	Elatus Plus (j-A; r, t-C)	0,75 L/ha	j - ČU; r,t - 42	
		benzovindiflupir+pr otiokonazol	Elatus Era (j-A; r, t-C)	1 L/ha	42	
		biksafen + tebukonazol	Zantara (j-A; r, t-C)	1,5 L/ha	35	

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	UKREPI	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L ali kg na ha)	KARENCA (dni)	OPOMBE, dovoljeno št. rab
		biksafen + fluopiram + protiokonazol	Ascra xpro (j-A; r, t-C)	j - 1,2 L/ha; r, t - 1,5 L/ha	ČU	
		biksafen + protiokonazol	Siltra xpro (j-A; r-C)	1 L/ha	ČU	
		biksafen + spirosamin + trifloksistrobin	Cayunis (j-A, r-C)	1 L/ha	ČU	
		boskalid + krezoksim-metil	Empartis (j-B, r-C)	1,5 L/ha	56	
		fluksapiroksad	Imtrex XE (j-A; r, o-C)	2 L/ha	ČU	
		fluksapiroksad + metkonazol	Librax (j-A, r-C)	1,33 – 2 L/ha	35	Zaloge v uporabi do: 28.10.2025
		fluksapiroksad + piraklostrobin	Mizona (j) A	1 L/ha	35	Zaloge v uporabi do: 31.7.2025
		mefentriflukonazol	Priaxor EC (j-A, r-C)	1,5 L/ha	35	
		mefentriflukonazol + fluksopiroksad	Revystar (j) A	1,5 L/ha	35	
		mefentriflukonazol + piraklostrobin	Revystar XL (j-A, r-C)	1,0 – 1,5 L/ha	35	
			Revytrex (j-A, r-C)	1,125 L/ha	35	
			Revyicare (j-A, r-C)	1,5 L/ha	35	
			Flexity (j) B	0,5 L/ha	35	Zaloge v uporabi do: 29.10.2025
			Retengo (j-A, r-C)	1,25 L/ha	35	Zaloge v uporabi do: 31.7.2025
			Verben (j-A, r-C)	1 L/ha	35	
			Cactai	0,65 L/ha	ČU	
			Era (staro ime Tartaros 300 EC) (j-B; r, t-C)	0,65 L/ha	ČU	
			Pecari 300 EC (j-A; r, t-C)	0,65 L/ha	35	
			Procer 300 EC (j-A; r, t-C)	0,65 L/ha	ČU	
			Promino 300 EC (j-A; r, t-C)	0,65 L/ha	ČU	
			Protendo 300 EC (j-A, r, t-C)	0,65 L/ha	35	

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	UKREPI	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L ali kg na ha)	KARENCA (dni)	OPOMBE, dovoljeno št. rab
		protiokonazol + spiroksamin	Tartaros (j-B; r, t-C)	0,65 L/ha	ČU	
		protiokonazol + spiroksamin + trifloksistrobin	Input (staro ime Prostaro plus) (j-A, r-C)	1,25 L/ha	42	
		protiokonazol + tebukonazol	Delaro Forte (j-A, r-C)	1,2-1,5 L/ha	42	
		tebukonazol	Prosaro (j-A; r, t-C)	1 L/ha	35	
			Bounty (j, r) -C	0,6 L/ha	35	
			Folicur EW 250 (j, r) -C	1 L/ha	42	
			Orius 25 EW (j) -B	1 L/ha	ČU	
	<b>Tehnika zatiranja:</b>					
	<b>Prag škodljivosti</b> je presežen, če ima v obdobju od začetka kolenčenja do začetka klasenja ječmena (BBCH 31-61) več kot 20 do 30 % rastlin bolezenska znamenja na katerem od najmlajših treh listov (znamenja obeh boleznih skupaj). Bolezni v ječmenu se ne zatira pred kolenčenjem (BBCH 31).					
<b>Fuzarioze klasov</b> ( <i>Fusarium sp.</i> )		benzovindiflupir + protiokonazol	Elatus Era (p, pi)	1 L/ha	42	1x/sezono
		biksafen + tebukonazol	Zantara (p, j, r, t)	1,5 L/ha	35	1x/sezono
		biksafen + protiokonazol	Siltra xpro (p, t)	1 L/ha	ČU	2x/sezono
		biksafen + fluopiram + protiokonazol	Ascra xpro (p, t)	1,5 L/ha	ČU	2x/sezono
		difenokonazol + tebukonazol	Magnello (p)	1 L/ha	ČU	1x/sezono
		mefentriflukonazol + piraklostrobin	RevyCare (p,t)	1 L/ha	35	2x/sezono
		mefentriflukonazol + krezoksim-metil	Duett turbo	1,0 L/ha	35	2x/sezono
		metkonazol	Caramba (p)	1,5 L/ha	35	2x/sezono
			Metso (p)	1,5 L/ha	35	2x/sezono
			Plexeo (p)	1,5 L/ha	35	2x/sezono
			Sirena (p)	1,5 L/ha	35	2x/sezono
		protiokonazol	Cactai	0,65 L/ha	ČU	2x/sezono

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	UKREPI	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L ali kg na ha)	KARENCA (dni)	OPOMBE, dovoljeno št. rab
			Era (staro ime Tartaros 300 EC) (p,j,t)	0,65 L/ha	ČU	2x/sezono
			Pecari 300 EC (p, j, t)	0,65 L/ha	35	2x/sezono
			Praktis (p)	0,8 L/ha	35	2x/sezono
			Procer 300 EC (p, j, t)	0,65 L/ha	ČU	2x/sezono
			Promino 300 EC (p, j, t)	0,65 L/ha	ČU	2x/sezono
			Protendo 300 EC (p, j, t)	0,65 L/ha	35	2x/sezono
			Tartaros (p, j, t)	0,65 L/ha	ČU	2x/sezono
		protiokonazol + spiroksamin	Input (staro ime Provaro plus) (p, j, r, o, t)	1,25 L/ha	42	1x/sezono
		protiokonazol + tebukonazol	Provaro (p, r, t)	1 L/ha	35	1x/sezono
		protiokonazol + spiroksamin + trifloksistrobin	Delaro Forte (p,j)	1,2-1,5 L/ha	42	2x/sezono
		prokvinazid + protiokonazol	Verben	1 L/ha	35	1x/sezono
		tebukonazol	Bounty (p)	0,6 L/ha	35	2x/sezono
			Buzz Ultra DF (p)	0,33 kg/ha	35	2x/sezono
			Folicur EW 250 (p)	1 L/ha	42	2x/sezono
			Orius 25 EW (p)	1 L/ha	ČU	2x/sezono
			Tebkin	1 L/ha	35	1x/sezono
			Tebusha 25 % EW (p, j, r, t)	1 L/ha	35	2x/sezono
		<i>Pythium oligandrum</i>	Polyversum (p, j, t, r, o)	0,1 kg/ha	1	3x/sezono
		<p><b>Tehnika zatiranja:</b>  Preprečevanje fuzarijskih okužb klasov se izvaja z rabo fungicidov v obdobju od sredine klasenja do sredine cvetenja žita (BBCH 55 do 65). Dejavniki, ki povečujejo tveganje za fuzarijske okužbe klasov so: sledenje koruze in žit v kolobarju, ostajanje žetvenih ostankov koruze na površini njiv, gojenje občutljivih sort žit, obilno gnojenje z dušikom, raba stabiliziranih fungicidov, deževno in vlažno vreme spomladi in med cvetenjem pšenice ali ječmena. Kadar sovpada več omenjenih dejavnikov je zatiranje boleznih s fungicidi priporočljiv ukrep. Najboljše učinke dosegajo snovi iz skupine triazolov.</p>				
Lomljivost žitnih bilk	<b>Agrotehnični ukrepi:</b> - dovolj širok kolobar, z manjšim	biksafen + protiokonazol	Silitra xpro (p,t)	1 L/ha	ČU	

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	UKREPI	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L ali kg na ha)	KARENCA (dni)	OPOMBE, dovoljeno št. rab		
<i>(Pseudocercospora/la herpotrichoides)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- deležem sternih žit,</li> <li>- primerna gostota setve,</li> <li>- zmerno gnojenje z dušikom,</li> <li>- ne prezgodnja setev.</li> </ul>	biksafen + fluopiram + protiokonazol	Ascra xpro (p, r, j, o)	j,o-1,2 L/ha; p,r-1,5 L/ha	ČU			
		boskalid + krezoksim-metil	Empartis (p, o)	1,5 L/ha	56			
		difenokonazol + fluksapiroksad	Brivela (p)	1,5 L/ha	56			
		fluksapiroksad	Imtrex XE (p, r, t, o)	2 L/ha	ČU			
		metrafenon	Flexity (p)	0,5 L/ha	35	Zaloga v uporabi do: 29.10.2025		
		prokvinazid + protiokonazol	Verben (p, t)	1 L/ha	35			
		protiokonazol + spiroksamin + trifloksistrobin	Delaro Forte (p, j)	1,2-1,5 L/ha	42			
		krezoksim-metil + mefentriflukonazol	Duett turbo	1 L/ha	o, p, r, t-35; j-ČU			
		<b>Tehnika zatiranja:</b>						
		Primeren čas za rabo fungicidov je med kolenjenjem (BBCH 32-37), vendar je težko določiti potrebo po zatiranju, ker v tem obdobju bolezenska znamenja še niso tako izrazita.						
<b>Prag zatiranja</b> je presežen, če je v tem obdobju okuženih več kot 20 % bilk.								
<b>Žitne rje (<i>Puccinia sp.</i>)</b> <b>Pšenična rja (<i>Puccinia tritici</i>),</b> <b>Rumena rja (<i>Puccinia striiformis</i>)</b> <b>Ječmenova rja (<i>Puccinia hordei</i>)</b> <b>Ovsova rja (<i>Puccinia coronifera</i>)</b> <b>Ržena rja (<i>Puccinia dispersa</i>)</b> <b>Žitna progasta rja (<i>Puccinia graminis</i>)</b>	<b>Agrotehnični ukrepi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- preprečevanje razvoja samosevcev na strniščih,</li> <li>- hitro in temeljito zaoravanje slame,</li> <li>- setev manj občutljivih sort in sort odpornih na sušo,</li> <li>- poznejša setev v jeseni.</li> </ul>	azoksistrobin	Amistar (p, j, r, t)	1 L/ha	35	2x/sezono		
		Chamane (p, j, r, t, o)	1 L/ha	35	2x/sezono			
		Mirador 250 SC (p, j, r, t)	1 L/ha	35	2x/sezono			
		Norios (j, r, t, o)	1 L/ha	35	2x/sezono			
		Ortiva (p, j, r, t)	1 L/ha	35	2x/sezono			
		Tazer 250 SC (p, j)	0,8 L/ha	35	2x/sezono			
		Velostar (p, j)	1 L/ha	ČU	2x/sezono			
		Zafra AZT 250 SC (p, j, r, t)	1 L/ha	35	2x/sezono			
		Zoxis 250 SC (r, j, p, t)	1 L/ha	35	2x/sezono			
		Amistar gold (p)	1 L/ha	ČU	1x/sezono			

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	UKREPI	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L ali kg na ha)	KARENCA (dni)	OPOMBE, dovoljeno št. rab
		azoksistrobin + tebukonazol	Mirador forte (p, t)	1,5- 2 L/ha	35	2x/sezono
		benzovindiflupir	Elatius Plus (p, j, r, t, pi, o)	0,75 L/ha	j, o-ČU; p, pi, r, t -42	1x/sezono
		benzovindiflupir + protikonazol	Elatius Era (p, j, r, t, pi, o)	1 L/ha	42	1x/sezono
		biksafen + tebukonazol	Zantara (p, j, r, t, o)	1,5 L/ha	35	1x/sezono
		biksafen + protikonazol	Silitra xpro (p, t, j, r, o)	1 L/ha	ČU	2x/sezono
		biksafen + spiroksamin + trifloksistrobin	Cayunis (p, j, t, r)	1 L/ha	ČU	2x/sezono
		biksafen + fluopiram + protikonazol	Ascra xpro (j-A; r,t-C)	j -1,2 L/ha; r,t -1,5 L/ha	ČU	j,o-1x, p,r,t-2x
		boskalid + krezoksim-metil	Empartis (p, j, r, t, o)	1,5 L/ha	56	2x/sezono
		difenokonazol	Greteg (p, pi, t, r)	0,5 L/ha	40	1x/sezono
		difenokonazol + fluksapiroksad	Brivela (p)	1,5 L/ha	56	1x/sezono
		difenokonazol + tebukonazol	Magnello (p)	1 L/ha	ČU	1x/sezono
		fluksapiroksad	Imtrex XE (p, j, r, t, o)	2 L/ha	ČU	2x/sezono
		fluksapiroksad + piraklostrobin	Mizona (p,pi)	1 L/ha	35	2x/sezono <b>Zaloge v uporabi do: 31.7.2025</b>
		fluksapiroksad + piraklostrobin	Priaxor EC (p, j, t, r)	1,5 L/ha	35	2x/sezono
		fluksapiroksad + metkonazol	Librax (p, t, r)	1,33 – 2 L/ha	35	2x/sezono <b>Zaloge v uporabi do: 28.10.2025</b>
		krezoksim-metil + mefentriflukonazol	Duett turbo	1 L/ha	o, p, r, t-35; j-ČU	2x/sezono
		mefentriflukonazol	Revystar (p, pi, j, t, o)	1,5 L/ha	35	2x/sezono
		mefentriflukonazol + fluksapiroksad	Revystar XL (p, j, r, t)	p-0,75-1,5 L/ha; j, r, t-	35	2x/sezono

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	UKREPI	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L ali kg na ha)	KARENCA (dni)	OPOMBE, dovoljeno št. rab
				1,5 L/ha		
		mefentriklonazol + fluksapiroksad	Revytrex (p, r, t)	1,125 L/ha	35	2x/sezono
		mefentriklonazol + piraklostrobin	Revyicare (p,r,t)	1,5 L/ha	35	2x/sezono
		metkonazol	Caramba (p, j, r)	1,5 L/ha	35	2x/sezono
			Metso (p)	1,5 L/ha	35	2x/sezono
			Plexeo (p, j, r)	1,5 L/ha	35	2x/sezono
			Sirena (p, j, r)	1,5 L/ha	35	2x/sezono
		piraklostrobin	Retengo (p,j,r,t)	1,25 L/ha	35	2x/sezono <b>Zaloge v uporabi do: 31.7.2025</b>
		prokvinazid + protiokonazol	Verben (p,j,r,t)	1 L/ha	35	raba 1x/sezono
		protiokonazol	Cactai	0,65 L/ha	ČU	2x/sezono
			Era (staro ime Tartaros 300 EC) (p,j,r)	0,65 L/ha	ČU	2x/sezono
			Pecari 300 EC (p, j, r, t)	0,65 L/ha	35	2x/sezono
			Praktis (p)	0,8 L/ha	35	2x/sezono
			Procer 300 EC (p, j, t)	0,65 L/ha	ČU	2x/sezono
			Promino 300 EC (p, j, r)	0,65 L/ha	ČU	2x/sezono
			Protendo 300 EC (p, j, r, t)	0,65 L/ha	35	2x/sezono
			Tartaros (p, j, r)	0,65 L/ha	ČU	2x/sezono
		protiokonazol + spiroksamin	Input (staro ime Prosaroplu) (j, r, o, t)	1,25 L/ha	42	1x/sezono
		protiokonazol + tebukonazol	Prosaroplu (p, j, r, t)	1 L/ha	35	1x/sezono
		protiokonazol + spiroksamin + trifloksistrobin	Delaro Forte (p,j,r,t)	1,2-1,5 L/ha	42	2x/sezono
		tebukonazol	Bounty (p, j, o, r, t)	0,6 L/ha	35	2x/sezono
			Buzz Ultra DF (p)	0,33 kg/ha	35	2x/sezono
			Folicur EW 250 (p, j, r, o)	1 L/ha	42	p-1x, r-2x/sezono

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	UKREPI	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L ali kg na ha)	KARENCA (dni)	OPOMBE, dovoljeno št. rab
<b>Ječmenova ramularijska pegavost</b> <i>(Ramularia collo-cygni)</i>	<b>Agrotehnični ukrepi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- preprečevanje razvoja samosevcev na strniščih,</li> <li>- širok kolobar,</li> <li>- hitra in temeljita obdelava žetvenih ostankov (mulčenja, zaoravanje).</li> </ul>	benzovindiflupir	Elatus plus	0,75 L/ha	42	raba 1x/sezono
		benzovindiflupir + protiokonazol	Elatus Era (j)	1 L/ha	42	raba 1x/sezono
		biksafen + tebukonazol	Zantara (j)	1,5 L/ha	35	raba 1x/sezono
		biksafen + protiokonazol	Silitra xpro (j)	1 L/ha	ČU	raba 2x/sezono
		biksafen + spioksamin + trifloksistrobin	Cayunis (j)	1 L/ha	ČU	raba 2x/sezono
		biksafen + fluopiram + protiokonazol	Ascra xpro (j)	1,2 L/ha	ČU	raba 1x/sezono
		fluksapiroksad	Imtrex XE (j)	2 L/ha	ČU	raba 2x/sezono
		fluksapiroksad + piraklostrobin	Priaxor EC (j)	1,5 L/ha	35	raba 2x/sezono
		fluksapiroksad + metkonazol	Librax (j)	1,33 – 2 L/ha	35	raba 2x/sezono <b>Zaloge v uporabi do: 28.10.2025</b>
		folpet	Folpan 500 SC	1,5 L/ha	ČU	raba 2x/sezono
		mefentrifluokonazol	Revystar (j)	1,5 L/ha	35	raba 2x/sezono
		mefentrifluokonazol + fluksopiroksad	Revystar XL (j)	1,0 -1,5 L/ha	35	raba 2x/sezono
		mefentrifluokonazol + piraklostrobin	Revytrex (j)	1,125 L/ha	35	raba 2x/sezono
	Revytrex (j)	1,5 L/ha	35	raba 2x/sezono		

**Tehnika zatiranja:** Pri izvajanju varstva žit se posveča rjam manjšo pozornost, saj večina sodobnih fungicidov dobro deluje nanje in se jih običajno zatira istočasno z drugimi povzročitelji. Le v posameznih letih, ko se rje pojavijo zgodaj in v večjem obsegu (npr. rumena rja), se jih zatira ciljano. Pri rumeni rji je prag zatiranja dosežen, ko je okuženih 1 do 3 % rastlin, pri ostalih rjah iz rodu Puccinia je dosežen, ko ima bolezenska znamenja 30 % rastlin.

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	UKREPI	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L ali kg na ha)	KARENCA (dni)	OPOMBE, dovoljeno št. rab
		profiokonazol + spirosamin + trifloksistrobin	Delaro Forte (j)	1,2-1,5 L/ha	42	raba 2x/sezono
	<p><b>Tehnika zatiranja:</b> Zaenkrat je bolezen možno zatirati samo s fungicidi. Ramularijsko pegavost se zatira v obdobju, ko imajo rastline formirane že vse liste (od BBCH 39), pa do začetka klasenja, ko so vidne konice tes (BBCH 51). Pri ramularijski pegavosti ni pragov škodljivosti. Bolezen zatiramo preventivno.</p>					
<b>Snežna plesen</b> ( <i>Monographella nivalis</i> [sin. <i>Microdochium nivale</i> ])	<p>Bolezen se preprečuje s setvijo razkuženega semena. V letih s snežno odejo je večja nevarnost za izbruh bolezni v primeru zgodnje in pregoste setve žit. Prizadete posevke se spomladi čim bolje oskrbuje, da si rastline, ki niso propadle, čim prej opomorejo. Gliva <i>Monographella nivalis</i> povzroča tudi listno pegavost na žitih, ki je podobna septorijski listni pegavosti in je pogostejša v hladnih in deževnih pomladih. Obe boleznii zatiramo skupaj.</p>					
<b>Ječmenova progavost</b> ( <i>Pyrenophora graminea</i> ) in <b>Ovsova progavost</b> ( <i>Pyrenophora avenae</i> )	<p><b>Tehnika zatiranja:</b> Povzročiteljska gliva se širi s semenom, zato je za preprečevanje okužb odločilnega pomena setev razkuženega semena.</p>					
<b>Rdeči žitni strgač</b> ( <i>Oulema melanopus</i> )	<p><b>Agrotehnični ukrepi:</b> - širok kolobar, - zgodnja setev jarin, - setev manj občutljivih sort.</p>					
	deltametrin	Decis 2,5 EC	0,2 - 0,3 L/ha	30	raba 2x/sezono	
		Decis 100 EC (p, j, o, r, t)	0,075 L/ha	7 dni	raba 1x/sezono	
		Delux 050 CS (p)	0,1 L/ha	27 dni	raba 1x/sezono	
		Poleci	0,2 - 0,3 L/ha	30	raba 2x/sezono	
	lambda-cihalotrin	Karate Zeon 5 CS (p, j, o, t, r)	0,15 L/ha	30	raba 2x/sezono	
	piretrin	Asset five (p, r)	0,38 L/ha	1	Manjša uporaba; raba 3x/sezono	
	tau-fluvalinat	Evure (p, t, r)	0,2 L/ha	30	raba 1x/sezono	
		Mavrik 240 (p, t, r)	0,2 L/ha	30	raba 1x/sezono	
	<p><b>Tehnika zatiranja:</b> Škodljivca običajno zatiramo v razvojnem stadiju ličinke, izjemoma v stadiju hrošča.</p>					
	<p>Za zatiranje ličink se odločamo na podlagi preseganja <b>kritičnih števil</b>. To je, če se najde v povprečju 1 do 2 ličinki na steblo oz. zastavičaja. V stadiju hrošča je strgača smiselno zatirati v primerih, če se v toplih pomladih še pred odlaganjem jajčec škodljivci zberejo v velikih populacijah na robovih njiv. Insekticid se uporabi lokalno, samo na teh predelih njiv.</p>					
<b>Listne uši</b> ( <i>Aphididae</i> )	<p><b>Agrotehnični ukrepi:</b> - zmerno gnojenje.</p>					
	deltametrin	Decis 100 EC (p, j, o)	0,063 L/ha	30	raba 1x/sezono	
		Decis 2,5 EC	0,2 - 0,3 L/ha	30	raba 2x/sezono	
		Poleci	0,2 - 0,3 L/ha	30	raba 2x/sezono	
	flonikamid	Afinto (p, t, r, j, o)	0,14 kg/ha	p, r, t 28; j, o	j, o - 1x; ; p, r, t - 2x	

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	UKREPI	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L ali kg na ha)	KARENCA (dni)	OPOMBE, dovoljeno št. rab
			Teppeki (p, t, r, j, o)	0,14 kg/ha	30	j, o - 1x; ; p, r, t - 2x
		lambda-cihalotrin	Karate Zeon 5 CS (p, j, o, t, r)	0,15 L/ha	30	raba 2x/sezono
		piretrin	Asset five (p, r)	0,38 L/ha	1	raba 3x/sezono
		pirimikarb	Pirimor 50 WG (p, j, o, t, r)	0,3 kg/ha	35	raba 2x/sezono
		tau-fluvalinat	Evure (p, t, r)	0,2 L/ha	30	ozimine 2x; jarine 1x
			Mavrik 240 (p, t, r)	0,2 L/ha	30	ozimine 2x; jarine 1x
	<p><b>Tehnika zatiranja:</b>  Uši se navadno zatira v obdobju cvetenja in ob začetku mlečne zrelosti žit.</p> <p><b>Prag škodljivosti</b> je presežen, ko je napadenih več kot 60 % klasov.</p>					

## 10.2 INTEGRIRANO VARSTVO ŽIT PRED PLEVELI

### Osnovni pristopi pri zatiranju plevelov v žitih:

Ustrezno posejana in negovana žita imajo dobro tekmovalno sposobnost. V žitih je možno tudi mehanično zatiranje plevelov, ki ga s posebnimi orodji (branimi, česali) izvajamo, dokler se žita ne razrastejo preveč. V integrirani pridelavi je obvezna vsaj enkrat letno uporaba česal v pridelavi pravih žit. Za uspešno zatiranje s to nekemično metodo moramo izvesti dvakratno do trikratno brananje – prečesavanje. Termin uporabe herbicidov je odvisen od termina setve, vremena in lastnosti plevelnih populacij na posameznih njivah. Zatiranje plevelov v ozimnih žitih že v jesenskem času je smiselno, če smo žita posejali zelo zgodaj in se zima prične pozno. V takšnih razmerah se pleveli v velikem številu razvijejo že jeseni in lahko že v stadiju razraščanja povzročijo izgube pridelka, ki jih pozneje ni mogoče več nadoknaditi. Za ta namen se uporabijo herbicidi, ki imajo kombinirano talno in listno delovanje. **Jesenski termin** je pomemben za zatiranje agresivnih plevelov, ki bi do spomladi že lahko prerasli občutljive stadije in bi jih takrat težko zatrili. Tekmovalna sposobnost jarih žit je slabša od ozimnih žit.

V žitih se je potrebno izogniti talnim herbicidom. V primeru poznih setev in počasnega razvoja plevelov jeseni, jesensko zatiranje ni smiselno. Herbicidi bi se čez zimo le izpirali, spomladi pa več ne bi bili učinkoviti. Sedaj imamo na voljo novejšje sulfonilsečninske herbicide s katerimi se lahko ob pomoči hormonskih herbicidov zgodaj spomladi zatre tudi višje stadije nevarnih širokolistnih jesenskih plevelov. Sulfonilsečniški herbicidi dokaj dobro delujejo tudi pri nižjih temperaturah, kar pa ne velja za hormonske herbicide (2,4-D, mekoprop-p, ..), ki za dobro delovanje potrebujejo vsaj 12 do 15° C. Pri uporabi hormonskih herbicidov morajo imeti pleveli dovolj veliko listno maso, sicer pri aplikaciji plevelne rastline vsrkajo premajhno količino aktivne snovi. Predolgo z uporabo teh herbicidov se ne smemo odlašati.

Opombe: ČU – čas uporabe, VVOI- najozlje vodovarstveno območje.

(J-JEČMEN; O-OVES, PI-PIRA; P-PŠENICA; R-RŽ; T\_TRITIKALA)

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	NAČIN UPORABE	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L, g ali kg na ha)	KARENCA, OPOMBE
Enoletni širokolistni pleveli - delno nekateri enoletni ozkolistni pleveli	Po vzniku posevka in plevelov	amidosulfuron	Grodyl (p, j, o, r, t, pi)	0,040 g/ha	ČU
		pendimetalin	Sharpen 33 EC (p) Sharpen plus (p) Stomp Aqua (p, j, r, t)	3 – 5 L/ha 2,5 – 4 L/ha 2,9 L/ha	ČU ČU ČU
Enoletni ozkolistni in širokolistni pleveli	Uporaba pred in po vzniku	diflufenikan	Flash 500 SC (p, j)	0,28 L/ha	ČU
		diflufenikan + flufenacet	Arnold (p)	0,6 L/ha	ČU; Prepovedan na VVOI.
		klorotoluron	Tolurex 50 SC (p, j)	2,5-4 L/ha	ČU
		prosulfokarb	Boxer (p, j, r, t)	5 L/ha	ČU
		diflufenikan + florasulam + penoksulam	Bizon (p, j, r, t, pi)	1 L/ha	ČU
		diflufenikan + klorotoluron + pendimetalin	Trinity (p, j, r, t)	2 L/ha	ČU
		florasulam + pinoksaden	Axial One (p, j)	1 – 1,3 L/ha	ČU
		florasulam + piroksulam	Corello duo (p, r, t, pi)	0,170 – 0,265 g/ha	ČU
		jodosulfuron + mezosulfuron	Zeppos (ozimna p, r, t)	0,4 kg/ha	ČU
		piroksulam	Pallas 75 WG (p, t, r)	0,12 - 0,25 g/ha	ČU
Ozkolistni pleveli	Po vzniku	flufenacet	Fluent 500 SC (p, j)	0,4 L/ha	ČU
		pinoksaden	Axial (p, j)	0,6 - 1,2 L/ha	ČU
Enoletni širokolistni pleveli	Uporaba pred in po vzniku	fenoksaprop-p-etil	Sunda (j, op, jp, r, t)	1,0-1,2 L/ha	ČU
		izoksaben	Flexidor (p, j)	0,25 L/ha	ČU
Enoletni, dvoletni in večletni ozkolistni in širokolistni pleveli	Pred vznikom žit	glifosat v obliki izopropilamino soli + glifosat v obliki kalijeve soli	Clinic xtreme (staro ime Credit xtreme)	1,33 – 4,0 L/ha	ČU
		glifosat v obliki izopropilamino soli	Bqm super (j, o, p)	1,5 L/ha	ČU

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	NAČIN UPORABE	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L, g ali kg na ha)	KARENCA, OPOMBE
Enoletni in večletni širokolistni pleveli, delno nekateri enoletni ozkolistni pleveli	Po vzniku žit in plevelov	2,4-D	Herbocid XL (p, j, r, t)	1,25 L/ha	ČU
		2,4-D + florasulam + aminopiracid	Mustang forte (p, j, t, r, o)	0,8 – 1 L/ha	60
		2,4-D-2-EHE	Esteron (p, j, t)	0,75 - 1 L/ha	ČU
		amidosulfuron + jodosulfuron	Sekator OD (p, j, r, t)	0,15 L/ha	ČU
		amidosulfuron + jodosulfuron + 2,4-D	Sekator plus (p, t, j, r)	0,6 L/ha	ČU
		aminopiracid + florasulam	Lancelot super (p, t, r, j)	25 – 33 g/ha	ČU
		bensulfuron-metil + metsulfuron-metil	Xanadu (p, j, o, r, t)	0,1 kg/ha	ČU
		bentazon	Basagran 480 (p, j, r, o, t)	2 L/ha	ČU; Prepovedan na VVOI.
		diflufenikan + jodosulfuron + mezosulfuron	Alister New (p)	1 L/ha	ČU
		dikamba + MCPA	Battery (p, j)	5 L/ha	ČU; Prepovedan na VVOI.
		dikamba+tritosulfuron	Arrat (p, j)	0,2 kg/ha	ČU; za zeleno krmo 50 dni; Ne na VVOI
		florasulam	Flyer (p, j, r)	0,1 - 0,15 L/ha	ČU
		florasulam + 2,4-D 2-EHE	Mustang 306 SE (p, j)	0,4 - 0,6 L/ha	ČU
		florasulam + diflufenikan	Lector delta (p, j, r, t)	0,075 – 0,1 L/ha	ČU
		florasulam + fluroksipir	Clyde FX (p, j, o, r, t)	1,5 L/ha	ČU
	Flurostar super (p, j, r, t)	1,5 L/ha	ČU		
	Valentia (p, j, o, r, t)	1,2 – 1,6 L/ha	ČU		

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	NAČIN UPORABE	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L, g ali kg na ha)	KARENCA, OPOMBE
		florasulam + halauksifen-metil	Quelex (p, j, t, r, pi)	37,5 – 50 g/ha	ČU
		florasulam + tribenuron-metil	Saracen max (j, o, p, r, t)	0,025 kg/ha	ČU
		florasulam + tritosulfuron	Biathlon 4D (p, j, o, pi, r, t)	0,07 kg/ha	ČU; Prepovedan na VVOI.
		fluroksipir	Bonaca (p, j)	0,6 – 0,8 L/ha	ČU
			Eltivis (p, j)	0,6-0,8 L/ha	ČU
			Flurostar 200 (j, r, t, p)	jj, jp - 0,75 L/ha; p,j,r,t-1,0 L/ha	ČU
			Flurostar forte (p, j, r, t)	0,5 L/ha	ČU
			Starane forte (p, j, o, r, t, pi)	0,54 L/ha	ČU
		jodosulfuron	Hussar OD (p, j, r, t)	0,1 L/ha	ČU
		jodosulfuron + mezosulfuron	Hussar plus (jj, p, r, t)	0,15 – 0,2 L/ha	ČU
		jodosulfuron + tienkarbazon-metil	Hussar star (p, r, t)	0,2 – 0,3 kg/ha	ČU; Dodajanje močila!
		jodosulfuron-metil natrij + mezosulfuron+tienkarbazon-metil	Atlantis Star (p, t)	0,2 - 0,33 kg/ha	ČU
		klopiralid	Clap (p, j,o,r, t)	0,3 – 0,4 L/ha	ČU; Prepovedan na VVOI. Na isti površini lahko vsake tri leta
			Clap forte (pi, r)	0,167 kg/ha	ČU; Prepovedan na VVOI.
			Lontrel 72SG (p, j, o)	0,17 kg/ha	ČU; Prepovedan na VVOI.
			Major 300 SL (p)	0,3-0,4 L/ha	ČU; Prepovedan na VVOI.
		MCPA	EMCEE (p, j, r, o, t)	1 L/ha	ČU; Prepovedan na VVOI.
		MCPA - DMA	U – 46 M fluid (p, j, r, t)	1 L/ha	ČU; za zeleno krmo 60 dni;

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	NAČIN UPORABE	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L, g ali kg na ha)	KARENCA, OPOMBE
		mekoprop-p	Duplosan KV (p, j)	2 L/ha	Prepovedan na VVOI.
		metsulfuron-metil	Duplosan KV 600 (p, j, o, r, t)	1,5 L/ha	ČU; Prepovedan na VVOI.
			Ally SX (p, j, r, o, t, pl)	0,030 kg/ha	ČU; Prepovedan na VVOI.
			Finy (p, r, t)	0,030 kg/ha	ČU
			Mezzo (strna žita)	0,020 –0,030 g/ha	ČU
			Savvy (p, j, o, t)	0,030 kg/ha	ČU
		metsulfuron-metil + diflufenikan	Alliance (p, j, r, t)	0,1 kg/ha	ČU
		metsulfuron-metil+ tribenuron-metil	Boudha (p, j, r, o, t)	0,20 kg/ha	ČU
		metsulfuron-metil+trifensulfuron-metil tribenuron – metil	Ergon (p, j)	0,060-0,070 kg/ha	ČU
			Adentis (p, j)	0,020 kg/ha	ČU
			Corida (p, j)	0,020 kg/ha	ČU
			Flame (p, j)	0,030 kg/ha	ČU
			TBM 75 WG (j, p, o, r, t)	0,020 kg/ha	ČU

Pripravki so registrirani za uporabo pred in po vzniku žit. Pri integrirani pridelavi se priporoča predvsem uporabo po vzniku. Termin uporabe mora biti prilagojen začetnemu razvoju plevelov in žit (možni pojavi fitotoksičnosti ob uporabi med vznikanjem in v dobi razvoja prvih listov žit). Če se jih uporabi po vzniku se lahko tudi pri njihovi uporabi upošteva kritična števila.

## 10.3 INTEGRIRANO VARSTVO KORUZE PRED BOLEZNIMI IN ŠKODLJIVCI

Opombe: ČU – čas uporabe, VVOI- najože vodovarstveno območje.

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	UKREPI	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L ali kg na ha)	KARENCA (dni)	OPOMBE
Listne pegavosti in progavosti povzročene od gliv	<b>Agrotehnični ukrepi:</b> - izboru odpornih hibridov, - zaoravanje rastlinskih ostankov.	fluopiram + protiokonazol	Propulse	1,0 L/ha	42	Tretira se od fenofaze začetka rasti stebela, do

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	UKREPI	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L ali kg na ha)	KARENCA (dni)	OPOMBE
( <i>Exserohilum turcicum</i> , <i>Cochliobolus carbonum</i> )		mefentriflukonazol	Revyona	1,25 L/ha	56 dni koruza za zrnje, 35 dni koruza za silažo	faze konca cvetenja (svila povsem suha) (BBCH 30-69) Tretira se od razvojne faze, ko je zaznavno prvo kolence, do faze konca cvetenja: svila povsem suha (BBCH 31-69)
		piraklostrobin	Retengo	1,0 L/ha	ČU	S sredstvom se tretira v fenološki fazi od začetka rasti stebela, do fenološke faze, ko moški cvetovi: zgornji in spodnji del metlice cvetijo; ženski cvetovi: svila popolnoma zunaj (BBCH 30-65). <b>Zaloga v uporabi do 31.7.2025.</b>
<b>Bolezni, ki jih povzročajo glive iz rodu Fusarium:</b> <i>F. graminearum</i> , <i>F. moniliforme</i> , <i>F. culmorum</i> , <i>F. sambucinum</i> , <i>F. lateritium</i>	<b>Agrotehnični ukrepi:</b> - setev razkuženega semena, - širok kolobarjenjem (ko fuzarioze pričnejo presegati prag 10 do 15% močno napadenih rastlin je potrebno v kolobarju občasno zmanjšati delež koruze in žit), - pri spravilu koruze za zrnje se koruznico zdrobi na čim manjše delčke in jo hitro zaoirje, - izbor hibridov s hitrim mladostnim razvojem, in robustnim stebлом, - spravilo pridelka v optimalnem roku, - obvladovanje koruzne večče in drugih škodljivcev,	protiokonazol + tebukonazol	Prosaro	1,0 L/ha	56	Koruzo se tretira ob uporabi ustrezne mehanizacije v razvojni fazi od zaznavnega tretjega kolenca do konca cvetenja - svila povsem suha (BBCH 33-69).
		mefentriflukonazol	Revyona	1,25 L/ha	56 dni koruza za zrnje, 35 dni koruza za silažo	Tretira se od razvojne faze, ko je zaznavno prvo kolence, do faze konca cvetenja: svila povsem suha

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	UKREPI	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L ali kg na ha)	KARENCA (dni)	OPOMBE
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zmanjševanje možnosti za poškodbe od ptic,</li> <li>- ustrezno sušenje in skladiščenje storžev ali zrnja.</li> </ul>	<i>Pythium oligandrum</i>	Polyversum	0,1 kg/ha	1	(BBCH 31-69). Tretira se v razvojni od začetka cvetenja, ko so pri moških cvetovih vidni prašniki v sredini metlice in ko pri ženskih cvetovih konica klasa (storžka) vznikla iz listne nožnice, do konca cvetenja, ko je svila povsem suha (BBCH 61-69).
		<i>Trichoderma asperellum</i>	Xilon*	10 kg/ha	ČU	
		*Sredstvo se aplicira v vrste, 2-5 cm globoko. Sredstvo se aplicira neposredno za semenom v odprt setveni kanal izključno s sejnalno opremo, ki ima dodatno nameščene aplikatorje za zadelavo (inkorporacijo) mikrogranul na ustrezno globino.				
<b>Koruzna bulava sent</b> ( <i>Ustilago maydis</i> )	<p><b>Agrotehnični ukrepi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uporaba razkuženega semena (preprečimo začetne okužbe v maju),</li> <li>- izbor manj občutljivega hibrida,</li> <li>- izogibanje mehanskim poškodbam pri obdelavi,</li> <li>- uravnoteženo gnojenje,</li> <li>- v sušnih letih namakanje (kjer so možnosti),</li> <li>- zatiranje koruzne vešče in drugih škodljivcev,</li> <li>- zaoravanje ostankov bul, ki ležijo na površini tal.</li> </ul>					

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	UKREPI	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L ali kg na ha)	KARENCA (dni)	OPOMBE
<b>Koruzna rja</b> ( <i>Puccinia maydis</i> )	<b>Agrotehnični ukrepi:</b> - temeljito zaoravanje ostankov koruznice povzroči propad večine spor, ki omogočijo nadaljnji razvoj glive.  Neposredno zatiranje te rje pri nas ni potrebno. Izjemoma je zatiranje potrebno le pri pridelovanju semenske koruze.	piraklostrobin	Retengo	1,0 L/ha	ČU	S sredstvom se tretira v fenološki fazi od začetka rasti stebela, do fenološke faze, ko moški cvetovi: zgornji in spodnji del metlice cvetijo; ženski cvetovi: svila popolnoma zunaj (BBCH 30-65). <b>Zaloge v uporabi do 31.7.2025.</b>
<b>Ošesna pegavost</b> ( <i>Kabatiella zeae</i> )		fluopiram + protiokonazol	Propulse	1,0 L/ha	42	Tretira se od fenofaze začetka rasti stebela, do faze konca cvetenja (svila povsem suha) (BBCH 30-69).
		mefentriflukonazol	Revyona	1,25 L/ha	56 dni koruza za zrnje, 35 dni koruza za silažo	Tretira se od razvojne faze, ko je zaznavno prvo kolence, do faze konca cvetenja: svila povsem suha (BBCH 31-69).
		piraklostrobin	Retengo	1,0 L/ha	ČU	S sredstvom se tretira v fenološki fazi od začetka rasti stebela, do fenološke faze, ko moški cvetovi: zgornji in spodnji del metlice cvetijo; ženski cvetovi: svila popolnoma zunaj (BBCH 30-65). <b>Zaloge v uporabi</b>

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	UKREPI	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L ali kg na ha)	KARENCA (dni)	OPOMBE
<b>Korzna plesen</b> ( <i>Sclerophthora macrosperma</i> )	Korzna plesen se pojavlja občasno, vedno v povezavi z zastajanjem vode ali poplavljenostjo zemljišča. Izбира primernih zemljišč za setev koruze je edini ukrep.					do 31.7.2025.
<b>Pokalice - strune:</b> ( <i>Agriotes ustulatus</i> , <i>Agriotes sputator</i> , <i>Agriotes obscurus</i> , <i>Agriotes lineatus</i> )	<p><b>Agrotehnični ukrepi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kolobar,</li> <li>- obdelava tal,</li> <li>- čas in način setve,</li> <li>- ustrezno gnojenje in zatiranje plevela</li> <li>- v kolobar se vključijo na primer ajdo, lan, konopljo, proso, saj vplivajo na zmanjšanje števila strun v tleh</li> <li>- izogiba se prepogosti setvi žit, lucerne in detelj v kolobarju</li> <li>- večkratna mehanični obdelava tal (npr. brananje, česanje in okopavanja),</li> <li>- preoravanje in večkratno brananje zemljišča v suhem vremenu (najboljše rezultate se doseže, ko je temperatura tal &gt;10 °C in se strune nahajajo v zgornjih 10 cm tal),</li> <li>- uporaba apnenega dušika.</li> </ul>	lambda-cihalotrin	Artemide	3,6 ml/100 zrn koruze	ČU	
		teflutrin	Force 1,5 G * Force evo *, Distar maxi *	7 kg/ha 16 kg/ha, sladka koruza 12-16 kg/ha	ČU Čas in način uporabe	
		spinosad	Laser GR	12 kg/ha	ČU	
		teflutrin	Soilguard 0.5 GR * Teflix *	15 kg/ha 7 kg/ha	ČU ČU	
		lambda-cihalotrin	Trika expert	15 kg/ha	ČU	

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	UKREPI	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L ali kg na ha)	KARENCA (dni)	OPOMBE
	<p><b>*Z naštetimi sredstvi, ki vsebujejo a.s. teflutrin, lambda-cihalotrin (izjema je sredstvo Artemide) in spinosad</b> se tretira v času setve, tako da se sredstvo skupaj s semenom vnaša v tla. Tretiranje je dovoljeno samo s pomočjo posebnih dozirnih naprav (dozatorjev), ki se jih namesti na sejalinico in s katerimi se natančno odmerja količino sredstva.</p> <p><b>Kritično število:</b> Kemična sredstva se uporablja le na podlagi talnih pregledov (izkopov) in ugotavljanja kritičnih števil, ki se jih izvaja konec poletja ali zgodaj jeseni. Če se kritično število ugotavlja z metodo kopanja jam, je prag škodljivosti od ena do tri strune na m<sup>2</sup>. Na hektar se izkoplje najmanj pet jam velikosti 0,25 m<sup>2</sup> (50 x 50 cm). Za ugotavljanje kritičnega števila se lahko uporablja tudi rastlinske vabe, s katerimi se privablja strune (npr. sadike solate, gosto posejana žita, gomolje krompirja, korenje itn.). Okolico vabe se očisti vseh plevelov in drugih rastlin. Prag škodljivosti je v tem primeru od 2 do 5 strun na m<sup>2</sup>, upoštevati pa je potrebno gostoto setve (silažna koruza ali koruza za zrnje), stopnjo zapleveljenosti in kolobar, saj se lahko največji napad strun pričakuje takrat, ko se koruzo seje v kolobarju za travno-deteljnimi mešanici ali žitom.</p>					
<b>Majski hrošč</b> ( <i>Melolontha melolontha</i> )	<p><b>Agrotehnični ukrepi in posredno zatiranje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uničevanje plevelov, saj samice najraje odlagajo jajčeca v zapleveljene njive in travišča</li> <li>- izvajanje različnih mehanskih metod in postavljanje mehanskih preprek, ki zmotijo razvojni krog poljskega majskega hrošča</li> <li>- plitva obdelava tal med vegetacijo s krožnimi branami ali prekopalniki (nekajkrat zaporedoma v sončnem vremenu)</li> </ul> <p><b>Prag škodljivosti</b> je pri ogrcih majskega hrošča zelo različen in odvisen od starosti (velikosti) ogrcev. Na njivah in travnikih je kritično število 15–20 ogrcev na m<sup>2</sup>. Zatiranje odraslih osebkov je skoraj nesmiselno in največkrat ni potrebno.</p>					
<b>Koruzna vešča</b> ( <i>Ostrinia nubilalis</i> )	<p><b>Agrotehnični ukrepi in posredno zatiranje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pravočasno odstranjevanje koruznice s polj oziroma čim temeljiteje in čim bolj globoko zaoravanje, po možnosti sesekljanih koruznih ostančkov, zaoravanje koruznice se opravi čim prej, najbolje že v jesenskem času, saj so gosonice v podoranih steblih preko zime izpostavljene mikroorganizmom, ki zmanjšajo številčnost gosenic,</li> <li>- ustrezen kolobar,</li> </ul>	klorantraniliprol	Coragen	125 mL/ha	7	2x /rastno dobo Interval med tretiranjmi ne sme biti krajši od 14 dni. <b>Prepovedan na VVOI.</b>
		Voliam		125 mL/ha	7	
		deltametrin	Decis 2,5 EC	0,5 L/ha	30	Največ 2x na rastno sezono
			Decis 100 EC	125 mL/ha	30	1x na rastno sezono

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	UKREPI	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L ali kg na ha)	KARENCA (dni)	OPOMBE
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pridelava koruze izven območij z velikim tveganjem, h katerim se prištevata predvsem lanskoletna (napadena) koruzišča in neobdelane oziroma zapleveljene njive, poti in obronke z veliko divjega pelina, enega glavnih gostiteljev, robove gozdov in živih mej z veliko debelostebelnih zeli,</li> <li>- intenzivno spremljanje njenega razvoja, let metuljev s svetlobnimi ali feromonskimi vabami in število odloženih jajčec oziroma jajčnih legel.</li> </ul>					
	<p>Po nekaterih podatkih je <b>kritično število</b> od 4 do 8 jajčnih legel/100 pregledanih rastlin, po drugih podatkih pa je kritično število preseženo, kadar najdemo jajčna legla na 12 do 15 % pregledanih rastlin.</p>					
<b>Ozimna sovka</b> ( <i>Agrotis segetum</i> ) in <b>Ipsilon sovka</b> ( <i>Agrotis ipsilon</i> )	<p><b>Agrotehnični ukrepi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- spremljanje pojava in prisotnosti gosenic,</li> <li>- zgodnja setev,</li> <li>- ustrezno gnojenje in oskrba posevka, ki omogočita hiter mladostni razvoj in s tem manj možnosti za pojav večje škode na rastlinah,</li> <li>- redno odstranjevanje in zatiranje plevelov,</li> <li>- z obdelavo tal in okopavanjem zmanjšamo številčnost bub in gosenic v tleh.</li> </ul>	teflutrin	Distar maxi  Force evo	12-16 kg/ha  12-16 kg/ha	Čas in način uporabe  Čas in način uporabe	Tretira se v času setve sladke koruze, tako da se sredstvo zadela v vrste.  Manjša uporaba: sladka koruza.  Ročno tretiranje s sredstvom ni dovoljeno!
		lambda-cihalotrin	Trika expert	15 kg/ha	ČU	
		Dovoljena je le uporaba traktorskih sejalnic oz. sadilnikov. Sredstvo se nanaša ob setvi oziroma saditvi neposredno v vrste. Odmerja se s pomočjo mehanskih dozirnih naprav, brez podpore tlaka, ki se jih namesti na sadilnik oziroma sejalnico.				
	<b>Kritično število</b> za okopavine sta 2 gosenici druge ali tretje razvojne stopnje na m <sup>2</sup> . Pri nas je za zatiranje talnih sovkv možno ob setvi uporabiti talne insekticide.					
<b>Južna plodovrta</b> ( <i>Helicoverpa armigera</i> )		deltametrin	Decis 100 EC	125 mL/ha	30	
<b>Koruzni hrošč</b> ( <i>Diabrotica virgifera virgifera</i> )	<p><b>Agrotehnični ukrepi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kolobar (populacija hroščev bistveno manjša v koruziščih, kjer</li> </ul>	deltametrin	Decis 100 EC  Decis 2,5 EC	125 mL/ha  0,5 L/ha	30  30	1x na rasto sezono največ 2x na



semena, uporaba gnoja in gnojevke brez plevelnega semena, čista kmetijska tehnika ter oskrbovani robovi njiv. Prav tako lahko z gojitvenimi ukrepi kot so dobro pripravljeno setvišče, pravičen čas setve, ustrezno gnojenje in namakanje v dobri meri povečajo tekmovalno sposobnost koroze in s tem zmanjšajo potrebo po uporabi kemičnih in mehanskih ukrepov zatiranja plevela. Izpostaviti velja tudi vključitev strniščnih dosevkov v pridelovalni sistem. Že sama pravočasna obdelava bo v veliki meri zmanjšala velikost plevelne populacije, še višji pozitivni učinek pa se bo dosegel, če se bo v prazna strnišča posejalo strniščni dosevek. V zadnjem obdobju le-ti predstavljajo dodatno orodje za sistemsko naravnano zatiranje plevelov, ki lahko v veliki meri vplivajo na manjšo zapleveljenost v koruzi, kot najpomembnejšem kolobarnem členu pri nas. Strniščni dosevi v pozno poletnem in jesenskem obdobju s svojim tekmovanjem za svetlobo, hranila in vodo preprečujejo rast, razvoj in tvorbo semena različnih plevelnih vrst. Rastlinski ostanki, ki se jih spomladi pusti na površini (mulč) ali pa plitko zadela v tla, pa preprečujejo vznik plevelov. V pridelavi koroze je najbolj razširjena tehnika direktne setve v mrtvo zastirko iz prezimnih dosevkov. Koroza se prideluje tudi v tehnologiji žive zastirke iz posevkov, kjer se ob zadnjem medvrstnem okopavanju vseje podsevek (npr.; belo deteljo, ajdo, trpežno ljujko in podzemno deteljo). Obe tehnologiji sta s stališča izgube pridelka precej tvegani in precej odvisni od vremenskih razmer.

Opombe: ČU – čas uporabe, VVOI- najožje vodovarstveno območje.

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	NAČIN UPORABE	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L ali kg na ha)	KARENCA/OPOMBE
Enoletni ozkolistni pleveli, večletni ozkolistni pleveli, ki se razvijajo iz semen, nekatere vrste širokolistnega plevela	Pred ali po setvi koroze. Tudi po vzniku koroze.	dimetanamid -P	Frontier X2	1 - 1,4 L/ha	ČU za koroza za zrnje, koroza za silažo se lahko žanje v mlečni zrelosti. Pred setvijo inkorporacija. Pred vznikom plevela ali v fazi vznikanja plevela. <b>Prepovedan na VVOI.</b>
Enoletni ozkolistni in širokolistni pleveli	Pred vznikom ali po vzniku koroze do 4 listov Po setvi, vendar pred vznikom posevka (BBCH 00-09).	pendimetalin	Stomp Aqua	3,3 L/ha	ČU; pred vznikom plevelov, možna uporaba tudi po vzniku do 2 listov plevelov.
			Sharpen plus	2,5 - 4 L/ha	ČU
			Sharpen 33 EC	3 - 5 L/ha	ČU
	Pred ali po setvi koroze. Tudi po vzniku koroze.	terbutilazin + metolaklor	Primextra TZ Gold 500 SC	2,3 - 4,5 L/ha	ČU; pred setvijo inkorporacija. Odmerek odvisen od tal, vznika plevelov. <b>Terbutilazin 1x na istem zemljišču vsako 3. leto. Zaloge v uporabi do 23.7.2024. Prepovedan na VVOI.</b>
Enoletni ozkolistni in enoletni širokolistni pleveli	Po vzniku - koroza ima 2 do 6 listov	terbutilazin + dimetanamid-P	Akris	3 L/ha	Čas uporabe; pleveli pred ali po vzniku do največ 2 listov. <b>Terbutilazin 1x na istem zemljišču vsako 3. leto. Prepovedan na VVOI.</b>
Enoletni širokolistni in nekatere vrste ozkolistnega plevela	Pred vznikom ali po vzniku koroze do 3 listov	izoksafliutol	Merlin Flexx	0,3 – 0,4 L/ha	ČU za koroza za zrnje, koroza za silažo ne silirati pred mlečno zrelostjo. Pri uporabi sredstva po vzniku koroze se sredstva ne sme mešati s sredstvi za zatiranje ozkolistnega plevela.

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	NAČIN UPORABE	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L ali kg na ha)	KARENCA/OPOMBE
Enoletni širokolistni in ozkolistni pleveli		izoksafitofol + tienkarbazon-metil	Adengo	0,44 L/ha	ČU za korožo za zrnje, korožo za silažo ne silirati pred mlečno zrelostjo.
Enoletni ozkolistni in širokolistni pleveli	Pred vznikom ali po vzniku korože	S-metololaklor	Dual Gold 960 EC	1 – 1,5 L/ha	ČU za korožo za zrnje, 91 dni silažna k.; Pred vznikom korože samostojno, po vzniku v mešanici s FFS na osnovi mezo-triona + močilo. <b>Zaloga v uporabi do 23.7.2024. Prepovedan na VVOI.</b>
Enoletni ozkolistni in nekatere vrste širokolistnih plevelov			Efica 960 EC	1 – 1,5 L/ha	ČU za korožo za zrnje, 91 dni silažna k.; Pred vznikom korože samostojno, po vzniku v mešanici s FFS na osnovi mezo-triona + močilo. <b>Zaloga v uporabi do 23.7.2024. Prepovedan na VVOI.</b>
Nekatere vrste enoletnega širokolistnega plevela	Po vzniku - koroža ima 2 do 8 listov	piridat	Onyx	1,5 L/ha ali v deljenem (split) odmerku 2 x 0,75 L/ha	ČU. S sredstvom se tretira po vzniku plevela.
Enoletni in večletni širokolistni pleveli	Po vzniku - koroža ima 3 do 6 listov	dikamba + tritosulfuron	Arrat	0,2 kg/ha + močilo	ČU, za zeleno krmo 28 dni. Po vzniku plevelov, ko imajo 2 do 6 listov. <b>Prepovedan na VVOI.</b>
Enoletni in nekatere vrste večletnega širokolistnega plevela	Po vzniku - koroža ima 1 do 6 listov	bentazon	Basagran 480	0,3 kg/ha + močilo	ČU; po vzniku plevelov. Sredstva ni dovoljeno uporabljati v sladki koroži. <b>Prepovedan na VVOI.</b>
Enoletni in večletni širokolistni pleveli	Po vzniku - koroža ima 4 do 8 listov	bentazon	Beni	1 kg/ha	ČU; po vzniku plevelov. <b>Prepovedan na VVOI.</b>
Enoletni in večletni širokolistni pleveli	Po vzniku - koroža ima 2 do 8 listov. Če se sredstvo uporablja, ko imata koroža več kot 6 listov, se mora v tem primeru tretirati usmerjeno pod liste korože.	dikamba	Banvel 480 S	0,6 L/ha	ČU; po vzniku plevelov, ko imajo 2 do 4 liste. <b>Prepovedan na VVOI.</b>
		dikamba	Kalimba	0,6 L/ha	ČU; po vzniku plevelov, ko imajo 2 do 6 listov. <b>Prepovedan na VVOI.</b>
	Po vzniku - koroža ima 2 do 8 listov		Dicash	0,6 L/ha	ČU; po vzniku plevelov, ko imajo 2 do 6 listov. <b>Prepovedan na VVOI.</b>
			Kamba 480 SL	0,6 L/ha	ČU; po vzniku plevelov, ko imajo 2 do 6 listov. <b>Prepovedan na VVOI.</b>

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	NAČIN UPORABE	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L ali kg na ha)	KARENCA/OPOMBE
Enoletni in nekatere vrste večletnega širokolistnega plevela	Po vzniku - koruza ima 2 do 5 listov	dikamba	Mural	0,6 - 0,75 L/ha	ČU; po vzniku plevelov. Sredstva se ne sme uporabljati v semenski koruzi, sladki koruzi in koruzi s podsevkom. <b>Prepovedan na VVOI.</b>
Enoletni širokolistni pleveli	Po vzniku - koruza ima 4 do 6 listov	2,4-D 2-EHE	Esteron	1 L/ha	ČU
Enoletni in večletni širokolistni pleveli	Po vzniku - koruza ima 3 do 4 liste	2,4-D	Herbocid XL	1,25 L/ha	ČU; sredstvo se ne sme uporabljati v semenski koruzi.
Enoletni in nekatere vrste večletnega širokolistnega plevela	Po vzniku - koruza ima 4 do 5 listov	florasulam + 2,4-D 2-EHE	Mustang 306 SE	0,5 - 0,6 L/ha	ČU
Nekatere vrste širokolistnega plevela	Po vzniku - koruza ima 2 do 9 listov	klopiralid	Lontrel 72 SG	0,17 kg/ha	ČU; <b>Prepovedan na VVOI.</b>
Enoletni in večletni širokolistni pleveli	Po vzniku - koruza ima 2 do 6 listov	fluroksipir	Clap	0,3 L/ha	ČU; na isti površini se priporoča uporaba sredstva vsaka tri leta. <b>Prepovedan na VVOI.</b>
Enoletni in nekatere vrste večletnega širokolistnega plevela	Po vzniku - koruza ima 2 do 8 listov	tifensulfuron -metil	Starane forte	0,54 L/ha	ČU; tudi za sladko koruzo.
Enoletni širokolistni pleveli	Po vzniku - koruza ima 2 do 8 listov	prosulfuron	Bonaca	0,8 L/ha	ČU
Enoletni in nekatere vrste večletnega širokolistnega plevela	Po vzniku - koruza ima največ 7 listov	nikosulfuron	Harmony 50 SX	22,5 g/ha + močilo	ČU; po vzniku plevelov, ko imajo 2 do 4 liste.
Ozkolistni in širokolistni pleveli	Po vzniku - koruza ima 2 do 8 listov		Peak 75 WG	20 g/ha + močilo	ČU; po vzniku plevelov, ko imajo do 6 listov. <b>S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat vsako 3. leto.</b>
	Po vzniku - koruza ima 2 do 8 listov		Motivell	1 L/ha	ČU; po vzniku plevelov. Ne za sladko koruzo. <b>Prepovedan na VVOI.</b>
	Po vzniku - koruza ima 2 do 8 listov		Motivell extra 6 OD	0,75 L/ha ali deljena aplikacija 0,5 + 0,25 L/ha	ČU; po vzniku plevelov. Ne za sladko koruzo. <b>Prepovedan na VVOI.</b>
	Po vzniku - koruza ima 4 do 7 listov		Kelvin OD	1 L/ha	ČU; po vzniku plevelov, ko imajo vsaj 2 lista. <b>Prepovedan na VVOI.</b>
	Po vzniku - koruza ima 2 do 8 listov		Kelvin max	0,75 L/ha ali deljena aplikacija 0,5 + 0,25 L/ha	ČU; po vzniku plevelov. Ne za sladko koruzo. <b>Prepovedan na VVOI.</b>
			Nicosh	1 L/ha	60 dni; <b>prepovedan na VVOI.</b>
			Samson extra 6 OD	0,75 L/ha ali deljena aplikacija 0,5 + 0,25 L/ha	ČU; po vzniku plevelov. Ne za sladko koruzo. <b>Prepovedan na VVOI.</b>

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	NAČIN UPORABE	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L ali kg na ha)	KARENCA/OPOMBE	
Enoletni in nekatere vrste večletnega ozkolistnega plevla ter enoletnega širokolistnega plevla Enoletni ozkolistni in širokolistni plevli Ozkolistni in širokolistni plevli Enoletni ter večletni širokolistni in ozkolistni plevli Nekatere vrste enoletnega in večletnega širokolistnega in ozkolistnega plevla Enoletni in večletni širokolistni ter ozkolistni plevli Enoletni in večletni ozkolistni plevli ter širokolistni plevli			Samson 4 SC	1 L/ha	ČU; po vzniku plevelov. Ne za sladko koruzo. <b>Prepovedan na VVOI.</b>	
			Miliagro extra 6 OD	0,75 L/ha ali deljena aplikacija 0,5 + 0,25 L/ha	ČU; po vzniku plevelov. Ne za sladko koruzo. <b>Prepovedan na VVOI.</b>	
			Miliagro 240 SC	0,17 L/ha	ČU; po vzniku plevelov - v času intenzivne rasti. <b>Prepovedan na VVOI.</b>	
			Entail	0,17 L/ha	ČU; po vzniku plevelov - v času intenzivne rasti. <b>Prepovedan na VVOI.</b>	
			Bandera	1 L/ha	ČU; po vzniku plevelov - v času intenzivne rasti. <b>Prepovedan na VVOI.</b>	
			Primerio	1 L/ha	ČU; po vzniku plevelov - v času intenzivne rasti. <b>Prepovedan na VVOI.</b>	
		Po vzniku - koruza ima 2 do 8 listov		Talisman	1,125 L/ha	ČU; po vzniku plevelov - v času intenzivne rasti. <b>Prepovedan na VVOI.</b>
		Po vzniku - koruza ima 4 do 7 listov		Stretch	1 L/ha	ČU; po vzniku plevelov - v času intenzivne rasti. <b>Prepovedan na VVOI.</b>
		Po vzniku - koruza ima 2 do 8 listov	dikamba + nikosulfuron	Victus OD	1 L/ha	ČU; po vzniku plevelov - ko imajo vsaj 2 lista. <b>Prepovedan na VVOI.</b>
		Po vzniku - koruza ima 2 do 8 listov	nikosulfuron + rimsulfuron	Miliagro plus	0,8 L/ha	ČU; plevli v zelo zgodnjih razvojnih fazah. <b>Prepovedan na VVOI.</b>
	Po vzniku - koruza ima 2 do 8 listov		Aliseo	70 g/ha + obvezno močilo	ČU; po vzniku plevelov, ko imajo 2 do 4 liste. <b>Prepovedan na VVOI.</b>	
	Po vzniku - koruza ima 2 do 8 listov		Corey	100 g/ha	ČU; po vzniku plevelov - v času intenzivne rasti. <b>Prepovedan na VVOI.</b>	
	Po vzniku - koruza ima 2 do 8 listov	dikamba + nikosulfuron + prosulfuron	Spandis	0,4 kg/ha + močilo	ČU; <b>prepovedan na VVOI.</b>	
	Po vzniku - koruza ima 2 do 6 listov	dikamba + nikosulfuron + rimsulfuron	Aliseo plus	350-440 g/ha + močilo	ČU; <b>prepovedan na VVOI.</b>	
	Po vzniku - koruza ima 2 do 9 listov		Hector flex	0,48 kg/ha + močilo ali deljena aplikacija 0,24 + 0,24 kg/ha +	ČU; <b>prepovedan na VVOI.</b>	

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	NAČIN UPORABE	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L ali kg na ha)	KARENCA/OPOMBE
				močilo	
Enoletni širokolistni ter nekatere vrste ozkolistnega plevela	Po vzniku - koruza ima 4 do 8 listov	dikamba + nikosulfuron + rimsulfuron	Rinidi WG	440 g/ha	ČU; po vzniku plevelov - v času intenzivne rasti. <b>Prepovedan na VVOI.</b>
Ozkolistni in širokolistni pleveli	Po vzniku - koruza ima 2 do 8 listov	rimsulfuron	Tarot 25 WG	40 - 60 g/ha + obvezno močilo	ČU za koroza za zrnje, 63 dni sijažna koroza; plevati vsaj 2 do 3 liste. Sredstva se ne sme uporabljati na kraških in prepustnih tleh. <b>Prepovedan na VVOI.</b>
Nekatere vrste ozkolistnega in širokolistnega plevela	Po vzniku - od razvojne faze, ko je pri koruzi prvi list prodril skozi koleoptilo, do faze ko je razvitih 8 listov.		Rincon 25 SG	60 g/ha + močilo	ČU; <b>prepovedan na VVOI.</b>
Nekatere vrste enoletnega in večletnega širokolistnega in ozkolistnega plevela	Po vzniku - koruza ima od 1 do 7 listov		Rim 25 WG	60 g/ha + močilo	ČU; ne za semensko koroza. Po vzniku plevelov - v času intenzivne rasti. <b>Prepovedan na VVOI.</b>
Nekatere vrste enoletnega ozkolistnega in širokolistnega ter večletnega ozkolistnega plevela	Po vzniku - koruza ima 2 do 6 listov		Rimuron 25 WG	50 g/ha + močilo ali deljena aplikacija 30 g + 20 g/ha + močilo	ČU; sredstvo se meša z močilom HELM Surfer Plus. <b>Prepovedan na VVOI.</b>
Ozkolistni in širokolistni pleveli	Po vzniku - koruza ima 2 do 8 listov	tembotrion	Laudis	1,15 - 2,25 L/ha. Mogoča je tudi deljena (split) aplikacija.	ČU; tudi za sladko koroza. Optimalni ČU, ko je večina plevelov vznikla.
	Po vzniku - koruza ima 2 do 8 listov	tembotrion	Laudis WG 30	0,5 kg/ha + močilo ali deljena aplikacija 2 x 0,25 kg/ha + močilo	ČU; tudi za sladko koroza. Optimalni ČU, ko je večina plevelov vznikla.
Širokolistni in ozkolistni pleveli	Po vzniku - koruza ima 2 do 6 listov.	foramsulfuron	Equip	2 - 2,5 L/ha	ČU;
Enoletni ozkolistni in širokolistni pleveli ter divji sirek	Po vzniku - koruza ima 2 do 6 listov, v deljenem odmerku do 8 listov	foramsulfuron + tienkarbazon-metil	Monsoon active	0,75 - 2,0 L/ha. Mogoča je tudi deljena (split) aplikacija.	ČU; po vzniku plevelov - v času intenzivne rasti.
Ozkolistni in širokolistni pleveli	Po vzniku - koruza ima 2 do 6 listov	tembotrion + tienkarbazon-metil	Capreno	0,3 L/ha + močilo	ČU; po vzniku plevelov - v času intenzivne rasti.

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	NAČIN UPORABE	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L ali kg na ha)	KARENCA/OPOMBE
Enoletni in večletni ozkolistni pleveli, samosevna žita	Po vzniku - koruza ima 2 do 9 listov	cikloksidim	Focus ultra *A	1 - 2 L/ha + močilo ali 2 - 4 L/ha	ČU; sredstvo se meša z močilom DASH HC. Po vzniku plevelov. *A <b>POZOR! V koruzi se sme sredstvo uporabljati samo v posevku koruze, ki je tolerantna na aktivno snov cikloksidim!</b>
Širokolistni pleveli in navadna kostreba	Pred vznikom ali po vzniku koruze do 8 listov	mezotrion	Callisto 480 SC	0,25 - 0,3 L/ha Preem, 0,15 - 0,25 L/ha + močilo po vzniku	ČU; tretiranje z ročno oprtno škroplilnico ni dovoljeno.
Nekatere vrste širokolistnega plevela	Po vzniku - koruza ima 2 do 8 listov		Osorno	1,0 L/ha	ČU; po vzniku plevelov.
Enoletni širokolistni in nekatere vrste ozkolistnega plevela	Pred vznikom ali po vzniku koruze do 8 listov		Osorno 480	0,2 L/ha Preem, 0,2 - 0,27 L/ha po vzniku	ČU
Nekatere vrste širokolistnega plevela	Po vzniku - koruza ima 2 do 8 listov		Temsa SC	1,0 L/ha	ČU
Nekatere vrste enoletnega širokolistnega plevela in omejevanje navadne kostrebe	Po vzniku - koruza ima 2 do 8 listov	mezotrion + piridat	Botiga	1,0 L/ha ali deljena aplikacija 0,5 + 0,5 L/ha	ČU; pleveli do največ 4 listov.
Enoletni širokolistni in nekatere vrste ozkolistnega plevela	Pred vznikom ali po vzniku koruze do 4 listov	mezotrion + terbutilazin	Cataris Pro	2-2,3 L/ha	ČU; <b>S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat vsako 3. leto. Prepovedan na VVOI.</b>
Enoletni ozkolistni in širokolistni pleveli	Pred vznikom ali po vzniku koruze do 4 listov	mezotrion + S-metolaklor + terbutilazin	Lumax	3-4 L/ha	ČU; odmerek odvisen od tal, vznika plevelov. Pred razraščanjem ozkolistnih plevelov. <b>Terbutilazin 1x na istem zemljišču vsako 3. leto. Zaloge v uporabi do 23.7.2024. Prepovedan na VVOI.</b>
	Pred vznikom ali po vzniku koruze do 4 listov		Lumax H 537.5 SE	3-4 L/ha	ČU; odmerek odvisen od tal, vznika plevelov. Pred razraščanjem ozkolistnih plevelov. <b>Terbutilazin 1x na istem zemljišču vsako 3. leto. Zaloge v uporabi do 23.7.2024. Prepovedan na VVOI.</b>
	Po vzniku - koruza ima od 1 do 8 listov	mezotrion + nikosulfuron	Elumis	1,5 L/ha oz. *prilagojeni odmerek 1,3 L/ha	ČU; pleveli v zgodnejših razvojnih fazah. <b>*Odmerek prilagoditi pri nekaterih operacijah intervencije KOPOP - naravni viri Prepovedan na VVOI.</b>

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	NAČIN UPORABE	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L ali kg na ha)	KARENCA/OPOMBE
Nekatere vrste enoletnega in večletnega širokolistnega ter ozkolistnega plevela	Po vzniku - koruza ima 2 do 8 listov	mezotrion + nikosulfuron	Genki	1 - 1,2 L/ha	ČU; pleveli v času intenzivne rasti. <b>Prepovedan na VVOI.</b>
Enoletni in večletni ozkolistni pleveli ter širokolistni pleveli	Po vzniku - koruza ima 2 do 8 listov	mezotrion + nikosulfuron + rimsulfuron	Arigo	0,33 kg/ha + močilo	ČU; po vzniku plevelov. <b>Prepovedan na VVOI.</b>
Ozkolistni in širokolistni pleveli	Pred vznikom ali po vzniku koruze do 4 listov	petoksamid	Successor 600	2 L/ha	Čas uporabe; <b>Prepovedan na VVOI.</b>
Širokolistni in ozkolistni pleveli	Pred vznikom ali po vzniku koruze do 4 listov	petoksamid + terbutilazin	Koban TX	4 L/ha	Čas uporabe; <b>Terbutilazin 1x na istem zemljišču vsako 3. leto. Prepovedan na VVOI.</b>
Enoletni, dvoletni in večletni ozkolistni ter širokolistni pleveli	Pred ali po setvi, pred vznikom posevka	glifosat v obliki izopropilamino soli + glifosat v obliki kalijeve soli	Clinic xtreme (staro ime Credit xtreme)	1,2 – 4,0 L/ha	Čas uporabe; odmerek odvisen od časa uporabe (pred ali po setvi).

## 10.5 INTEGRIRANO VARSTVO KROMPIRJA PRED BOLEZNIMI IN ŠKODLJIVCI

Opombe: ČU – čas uporabe, VVOI- najožje vodovrstveno območje.

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	UKREPI	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L ali kg na ha)	KARENCA (dni)	OPOMBE, dovoljeno št. rab
<b>Krompirjeva plesen</b> ( <i>Phytophthora infestans</i> )	<b>Agrotehnični ukrepi:</b> - preprečevanje razvoja samosevcev, - preprečevanje odlaganja odpadnega krompirja v naravo, da nakaljevanje zgodnih sort, da dozorijo pred pojavom plesni, sajenje manj občutljivih sort, sajenje neokuženih gomoljev, ustrezna gostota sajenja, ustrezno osipanje, plast tal nad gomolji ob osipanju vsaj 5 cm, kar preprečuje/zmanjšuje okužbe gomoljev z zoosporami, redno pregledovanje nasadov na prisotnost plesni (primarne	ametotradin + metiram	Enervin	2 kg/ha	7	3x/sezono
		amisulbrom + oksatiapirolin	Zorvec Entecta	0,25 L/ha	7	Zaloge v uporabi do: 28.11.2024
		azoksistrobin + fluazinam	Signal super	0,5 L/ha	7	4x/sezono
		bakrov hidroksid + bakrov oksiklorid	Badge WG	3 kg/ha	7	3x/sezono
		bakrov oksid	Nordox 75 WG	1 kg/ha	14	4x/sezono
		bakrov oksiklorid	Cuprablau Z 35 WG	2,1 kg/ha	14	5x/sezono
			Cuprablau Z 35 WP	3 kg/ha	14	4x/sezono
			Zorvec Endavia	0,4 L/ha	7	3x/sezono
			bentiavailkarb-izopropil + oksatiapirolin			4x/sezono

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	UKREPI	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L ali kg na ha)	KARENCA (dni)	OPOMBE, dovoljeno št. rab
	okužbe, ki se običajno najprej pojavijo na steblih in sekundarne okužbe, običajno na listih), - izkop v primernih razmerah ob pravem času, da preprečimo okužbo gomoljev.	ciazofamid cimoksanil  cimoksanil + bakrov hidroksid cimoksanil + mandipropamid cimoksanil + propamokarb hidroklorid cimoksanil + zoksamid dimetomorf + ametotradin dimetomorf + fluazinam fluazinam  fluopikolid + propamokarb mandipropamid mandipropamid + difenokonazol metiram  propamokarb hidroklorid	Ranman top Curzate Partner Cymbal Sacron 45 DG Copforce Extra  Carial flex Proxanil 450 SC Rival duo  Reboot Orvego Banjo forte Banjo Frowncide Shirlan 500 SC Winby Infito Revus Revus top Polyram DF Sporax	0,5 L/ha 0,15 kg/ha 0,2-0,25 kg/ha 0,22 kg/ha 2 kg/ha 0,6 kg/ha 2-2,5 L/ha 2,5 L/ha 0,45 kg/ha 0,8 L/ha 1 L/ha 0,4 L/ha 0,4 L/ha 0,4 L/ha 0,4 L/ha 1,2-1,6 L/ha 0,6 L/ha 0,6 L/ha 2 kg/ha 1,4 L/ha	7 1 7 14 14 7 14 14 7 7 7 7 7 7 7 7 3 3 21 14	3x/sezono 4x/sezono 4x/sezono 4x/sezono 3x/sezono 6x/sezono 6x/sezono 1x/sezono 3x/sezono 3x/sezono 4x/sezono 6x/sezono 4x/sezono 4x/sezono 4x/sezono 4x/sezono 6x/sezono 3x/sezono 3x/sezono 5x/sezono Zaloge v uporabi do: 28.11.2024 4x/sezono; delno zatiranje

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	UKREPI	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L ali kg na ha)	KARENCA (dni)	OPOMBE, dovoljeno št. rab
Črna listna pegavost krompirja ( <i>Alternaria</i> sp.)	<p><b>Tehnika zatiranja:</b> Za uspešno obvladovanje krompirjeve plesni je odločilnega pomena pravočasen začetek škropljenj in pravilna izbira fungicida. S škropljenji je treba začeti preventivno, pred pojavom bolezni. Odločitev o začetku škropljenj pridelovalec sprejme na osnovi spremljanja vremenskih razmer, pregledovanja nasadov ter obvestil Opazovalno napovedovalne službe za varstvo rastlin. Izbor fungicida mora biti prilagojen pridelovalnim razmeram in razvoju krompirja. V mokrih letih, ko je nevarnost za razvoj boleznih velika, se za začetna škropljenja priporoča raba sistemskih fungicidov, v bolj sušnih razmerah ali, če se prideluje krompir na lahkih tleh, se lahko za začetna škropljenja uporabi dotikalni fungicid. V obdobju hitre in bujne rasti krompirja, ko je prirast listne mase zelo hiter, se priporoča raba fungicidov s sistemskim ali z delno sistemskim (translaminarnim) delovanjem. Ko se rast cime umiri lahko nadaljujemo škropljenja s translaminarnimi ali dotikalnimi fungicidi, odvisno od vremenskih razmer. Dotikalni pripravki na osnovi ciazofamida in ametoktradina se tudi manj izpirajo.</p> <p><b>Agrotehnični ukrepi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ukrepi za čimboljšo rast in preprečevanje stresa,</li> <li>- 3 do 5 letni kolobar.</li> </ul>	azoksistrobilin	Chamane	0,5 L/ha	ČU	2x/sezono
			Mirador 250 SC	0,5 L/ha	7	3x/sezono
Bela noga krompirja ( <i>Rhizoctonia solani</i> )	<p><b>Tehnika zatiranja:</b> Samo nekatera sredstva, ki jih uporabljamo za zatiranje krompirjeve plesni, učinkujejo tudi na črno listno pegavost krompirja, zato je v primeru pojava pegavosti potrebno dodajanje snovi proti tej bolezni. Kadar se črna listna pegavost pojavi zgodaj v rastni dobi in je nevarnost širjenja velika, jo zatiramo usmerjeno s pripravki na osnovi azoksistrobina ali difenokonazola.</p> <p><b>Agrotehnični ukrepi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- širok kolobar,</li> <li>- sajenje neokuženih gomoljev,</li> <li>- ukrepi za izboljšanje strukture in zračnosti tal,</li> <li>- sajenje v toplo zemljo, ne pregloboko.</li> </ul>	azoksistrobilin  difenokonazol  difenokonazol + fluksapiroksad difenokonazol + mandipropamid fluopiram + protiokonazol	Norios	0,5 L/ha	ČU	2x/sezono
			Ortiva	0,5 L/ha	7	3x/sezono
			Tazer 250 SC	0,5 L/ha	7	3x/sezono
			Zaftra AZT 250 SC	0,5 L/ha	7	3x/sezono
			Zignal Super	0,5 L/ha	7	3x/sezono
			Cuprablau Z 35 WP	3 kg/ha	14	3x/sezono
			Difcor 250 EC	0,5 L/ha	14	4x/sezono
			Mavita 250 EC	0,6 L/ha	3	2x/sezono
			Score 250 EC	0,6 L/ha	3	2x/sezono
			Sercadis plus	0,75 L/ha	3	3x/sezono
			Revus top	0,6 L/ha	3	3x/sezono
			Propulse	0,5 L/ha	21	2x/sezono
Bela noga krompirja ( <i>Rhizoctonia solani</i> )	<p><b>Tehnika zatiranja:</b> Samo nekatera sredstva, ki jih uporabljamo za zatiranje krompirjeve plesni, učinkujejo tudi na črno listno pegavost krompirja, zato je v primeru pojava pegavosti potrebno dodajanje snovi proti tej bolezni. Kadar se črna listna pegavost pojavi zgodaj v rastni dobi in je nevarnost širjenja velika, jo zatiramo usmerjeno s pripravki na osnovi azoksistrobina ali difenokonazola.</p> <p><b>Agrotehnični ukrepi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- širok kolobar,</li> <li>- sajenje neokuženih gomoljev,</li> <li>- ukrepi za izboljšanje strukture in zračnosti tal,</li> <li>- sajenje v toplo zemljo, ne pregloboko.</li> </ul>	azoksistrobilin	Mirador 250 SC	3 L/ha	7	tretiranje tal pred ali po sajenju
			Ortiva	3 L/ha	7	tretiranje tal pred ali po sajenju
			Zaftra AZT 250 SC	3 L/ha	7	tretiranje tal pred ali po sajenju
			Serenade ASO	5 L/ha	ni potrebna	tretiranje v jarke ob sajenju

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	UKREPI	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L ali kg na ha)	KARENCA (dni)	OPOMBE, dovoljeno št. rab
		QST 713				
		fluksapiroksad	Sercadis	20 mL/100 kg oz. 0,8 L/ha	ČU	tretiranje gomoljev tik pred sajenjem ali ob sajenju
		flutolanil	Moncut	200 ml/1 tona gomoljev	NP	tretiranje gomoljev pred ali ob sajenju
		<i>Phythium oligandrum</i> M1	Polyversum	0,25 - 0,5 kg/t gomoljev oz. 2,5-5 g/10 kg gomoljev	1 oz. ČU	samo za semenski krompir; tretiranje gomoljev v zaprtih prostorih - tretira se suho ali vlažno; predvidena poraba gomoljev je 4 t na ha
		<i>Pseudomonas</i> sp. sev DSMZ 13134	Protadix	2 g na 100 kg gomoljev oz. 60 g na ha	ni potrebna	tretiranje gomoljev tik pred sajenjem ali ob sajenju
		<b>Tehnika zatiranja:</b> Gomolje se lahko razkužuje pred saditvijo v skladišču ali na sadilniku ob sajenju. Pri uporabi nekaterih aktivnih snovi se škropi tla ob sajenju.				
Črna pikavost gomoljev ( <i>Colletotrichum coccodes</i> )	<b>Agrotehnični ukrepi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- širok kolobar,</li> <li>- sajenje neokuženih gomoljev,</li> <li>- izogibanje stresnim razmeram, zlasti skrb za enakomerno preskrbljenost z vodo,</li> <li>- uničevanje okuženih žetvenih ostankov.</li> </ul>	azoksistrobin	Chamane	3 L/ha	ČU	1x; tretiranje tal ob sajenju
			Mirador 250 SC	3 L/ha	7	1x; tretiranje tal ob sajenju
			Norios	3 L/ha	ČU	1x; tretiranje tal ob sajenju
			Ortiva	3 L/ha	7	1x; tretiranje tal ob sajenju
			Zaffra AZT 250 SC	3 L/ha	7	1x; tretiranje tal ob sajenju

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	UKREPI	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L ali kg na ha)	KARENCA (dni)	OPOMBE, dovoljeno št. rab
<b>Črna noga krompirja</b> ( <i>Pectobacterium carotovorum</i> subsp. <i>brasiliense</i> , <i>Pectobacterium wasabiae</i> , <i>Pectobacterium atrosepticum</i> , <i>Dickeya solani</i> )	<b>Tehnika zatiranja:</b> Neposredno kemično zatiranje te bakterijske bolezni ni možno. Osnovni vir kužila so okuženi gomolji in okužena tla (ki se jih je v prejšnjih letih okužilo z okuženim semenom). Zato je težišče zatiranja bolezni pri semenarjih, ki morajo pridelati neokužene ali čim manj okužene gomolje ter v izbiri neokuženih tal za sajenje. Pomembno je tudi obvladovanje mehanskih poškodb in čim hitreje sušenje gomoljev pri vseh fazah spravila, skladiščenja in priprave gomoljev. K zmanjšanju težav prispeva tudi širok kolobar ter z zgodnje izločanje okuženih rastlin iz nasadov. Paziti je potrebno, da se bakteriji ne raznaša po nasadu z orodji (npr. pri mehanskem zatiranju plevelov).					
<b>Krompirjeva obročkasta gniloba</b> ( <i>Clavibacter sepedonicus</i> ) in	<b>Clavibacter sepedonicus in Ralstonia solanacearum sta v EU uvrščena med karantenske škodljive organizme.</b> V primeru suma na krompirjevo obročkasto ali krompirjevo rjavo gnilobo je treba obvestiti UVHVVR. Obe bolezni se prenašata predvsem z okuženimi gomolji, zato je odločilnega pomena sajenje neokuženega semenskega krompirja. V EU je obvezno vsakoletno izvajanje preiskave za ugotavljanje navzočnosti obeh bolezni. Pomembno je, da se loči znake obeh omenjenih bolezni in črne noge krompirja. <b>Zatiranje:</b> V primeru potrditve okužbe se ukrepa v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2022/1194 o ukrepih za <i>Clavibacter sepedonicus</i> ter Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2022/1193 o ukrepih za <i>Ralstonia solanacearum</i> .					
<b>Krompirjeva rjava gniloba</b> ( <i>Ralstonia solanacearum</i> )	<b>Tehnika zatiranja:</b> Saditev odpornih sort. Krompirjev rak je karantenska bolezen, ki ima omejene vendar upoštevanja vredne možnosti za pojavljanje pri nas. O pojavih sumljivih znamenj je potrebno obvestiti UVHVVR. V primeru najdbe se ukrepa v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2022/1195 o ukrepih za <i>Synchytrium endobioticum</i> .					
<b>Koloradski hrošč</b> ( <i>Leptinotarsa decemlineata</i> )	<b>Agrotehnični ukrepi:</b> - preprečevanje razvoja samosevcev, - ustrezen kolobar, - preprečevanje možnosti za hranjenje hroščev na ostankih gomoljev in krompirjevke.	acetamidiprid azadirahthin A Neemazal - T/S Benevia Coragen Shenzi 200 SC, Voliam, Alverde olja navadne ogrščice + piretrin spinosad	Mospilan 20 SG Azatin EC Neemazal - T/S Benevia Coragen Shenzi 200 SC, Voliam, Alverde Raptol koncentrat Laser plus	0,1 kg/ha 1,5 L/ha 2,5 L/ha 0,125 L/ha 0,06 L/ha 0,06 L/ha 0,25 L/ha 8 L/ha 0,04 L/ha	14 3 4 14 14 14 14 14 3 14	2x/sezono 3x/sezono 2x/sezono 1x/sezono 2x/sezono 2x/sezono 2x/sezono 2x/sezono 2x/sezono 2x/sezono
	<b>Tehnika zatiranja:</b> Insekticide za zatiranje koloradskega hrošča je treba uporabiti dovolj zgodaj, ko so ličinke še majhne in bolj občutljive. Dokler so ličinke majhne je tudi povzročena škoda še razmeroma majhna. Ker gre za škodljivca, ki pri enostranski rabi insekticidov razmeroma hitro razvije odpornost nanje, je pri izbiri sredstev treba upoštevati tudi ta vidik in izbirati insekticide z različnimi načini delovanja. To velja tako za škropljenja v zaporednih letih kot tudi v primeru več škropljenj v eni rastni sezoni. Okvirni <b>prag zatiranja</b> je 15 do 20 mladih ličink/rastlino.					

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	UKREPI	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L ali kg na ha)	KARENCA (dni)	OPOMBE, dovoljeno št. rab
Štrune ( <i>Agrotis</i> spp.)	<p><b>Agrotehnični ukrepi:</b> Na dolgi rok z ustreznim kolobarjem (ustrezna pokritost tal preko celega leta) poskusimo preprečiti zaleganje jajčec pokalic v tla.</p>	<p><i>Beauveria bassiana, sev ATCC 74040</i></p>	<p>Naturalis</p>	<p>3 L/ha</p>	<p>NP</p>	<p>Ob sajenju se pred zagrinjanjem tretira tla in gomolje z 2 L/ha in še enkrat pred osipanjem z 1 L/ha.</p>
		<p>cipermetrin</p>	<p>Columbo 0,8 MG</p>	<p>24 kg/ha</p>	<p>ČU</p>	<p>Brez primerne opreme za inkorporacijo granul poraba sredstva ni dovoljena.</p>
		<p>lambda-cihalotrin</p>	<p>Trika expert</p>	<p>15 kg/ha</p>	<p>ČU</p>	<p>Ročni nanos sredstva ni dovoljen! Dovoljena je le uporaba traktorskih sejalic oz. sadilnikov. Sredstvo se nanaša ob saditvi neposredno v vrste. Odmerja se s pomočjo mehanskih dozirnih naprav, brez podpore tlaka, ki se jih namesti na sadilnik oziroma sejalnico.</p>
		<p>spinosad</p>	<p>Laser GR</p>	<p>12 kg/ha</p>	<p>ČU</p>	<p>Sredstvo se mora vnašati v brazdo z mikrogranulatorjem.</p>
		<p>teflutrin</p>	<p>Diastar maxi</p>	<p>16 kg/ha</p>	<p>ČU</p>	<p>Sredstvo se s pomočjo posebne dozirne naprave zadela neposredno v sadilno vrsto.</p>
			<p>Force evo</p>	<p>16 kg/ha</p>	<p>ČU</p>	<p>Sredstvo se s pomočjo posebne dozirne naprave zadela neposredno v sadilno vrsto.</p>

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	UKREPI	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L ali kg na ha)	KARENCA (dni)	OPOMBE, dovoljeno št. rab
Listne uši (Aphididae)	Tehnika zatiranja: Prag škodljivosti pri strunah za krompir znaša 2 do 3 strune na m <sup>2</sup> . Če so strune v tih prisotne je najbolje, da se take njive ne izbere za pridelovanje krompirja. Če druge njive ni na voljo, je smiselno zatiranje talnih škodljivcev z uporabo insekticidov ob saditvi.	acetamiprid	Mospilan 20 SG	0,2 kg/ha	14	2x
		flonikamid	Afinito	0,16 kg/ha	70	1x; ob pojavu l. uši; v semenskem krompirju se lahko rabi od fenološke faze tvorbe listov iz gomoljev do faze, ko je peti list glavnega stebila razgrnjen.
Sovke ( <i>Agrotis</i> sp.)	Tehnika zatiranja: V posevkih jedilnega krompirja listnih uši se navadno ne zatira, oz. se jih zatire skupaj s pripravki proti koloradskemu hrošču. Ločeno zatiranje se izvaja le izjemoma, če se ugotovi, da se je posadilo veliko z virusi okuženih gomoljev.	Tepeki		0,16 kg/ha	70	1x; ob pojavu l. uši; v semenskem krompirju se lahko rabi od fenološke faze tvorbe listov iz gomoljev do faze, ko je peti list glavnega stebila razgrnjen.
		lambda-cihalotrin	Karate Zeon 5 CS	0,15 L/ha	7	1x
		pirimikarb	Pirimor 50 WG	0,5 kg/ha	7	2x
		spirotramat	Movento SC 100	0,75 L/ha	14	4x
						<b>Zaloga v uporabi do: 30.10.2025</b>
		lambda-cihalotrin	Trika expert	15 kg/ha	ČU	Ročni nanos sredstva ni dovoljen. Dovoljena je le uporaba traktorskih sejalic oz. sadilnikov. Sredstvo se nanaša ob saditvi neposredno v vrste.

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	UKREPI	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L ali kg na ha)	KARENCA (dni)	OPOMBE, dovoljeno št. rab
<b>Krompirjeve ogorčice</b> <b>Bela krompirjeva ogorčica</b> ( <i>Globodera pallida</i> ) <b>Rumena krompirjeva ogorčica</b> ( <i>G. rostochiensis</i> ) spadata med karantenske škodljive organizme.	Za obe ogorčici je v celotni EU vsako leto obvezno izvajanje preiskave za ugotavljanje navzočnosti. V primeru najdbe <i>G. pallida</i> ali <i>G. rostochiensis</i> določa ukrepe Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1192. Rumena krompirjeva ogorčicajca je bila prvič ugotovljena leta 1999 na Koroškem ter pozneje še v Trenti in na Gorenjskem, na drugih območjih v Sloveniji pa se je doslej še ni ugotovilo. Leta 2011 je bila v občini Ivančna Gorica prvič potrjena najdba bele krompirjeve ogorčice.  Več podatkov o ukrepih in razmejenih območjih je objavljenih na spletni strani UVHVVR Pri nas je proti ogorčičam na krompirju registriran pripravke Velum prime (0,625 L/ha).					

#### 10.6 INTEGRIRANO VARSTVO KROMPIRJA PRED PLEVELI

**Osnovni pristopi pri zatiranju plevelov v krompirju:** V nasadih krompirja imamo običajno opravka z mešano plevelno združbo, ki jo sestavljajo dresni, ščiri, metlike, smolenec, kamilice, lobode, prosaste trave, pogosto tudi trajni pleveli kot so plazeča pirnica, njivski slak in osat. Zatiranje plevelov v krompirju se lahko izvaja pred ali po vzniku krompirja. Pred vznikom se tretira s talnimi herbicidi. Pogoj za dobro delovanje talnih herbicidov so dovolj vlažna tla, ki omogočajo enakomerno razporeditev snovi v zgornjem sloju tal, od koder jih kaleči pleveli srkajo skupaj z vlago. Z njimi se lahko škropi kmalu po sajenju krompirja, ko se tla sesedejo, z nekaterimi se lahko škropi še tik pred vznikom krompirja. Herbicidi na osnovi metribuzina se lahko rabijo tudi zgodaj po vzniku krompirja, do višine 5 do 10 cm. Ko krompir preraste to višino se občutljivost krompirja hitro povečuje in lahko pride do poškodbe rastlin. Po vzniku krompirja sta registrirana tudi herbicida bentazon in rimsulfuron. Delujeta izključno prek listov, zato sta učinkovita le proti že vzniklim plevelom. Z njima se škropi, ko je krompir visok okoli 10 cm. Možna je tudi raba polovičnih odmerkov v razdobju od 7 do 10 dni. Tudi travne plevele se lahko zatira s specialnimi herbicidi po vzniku krompirja. Enoletne trave se zatira v obdobju, ko imajo razvite od 2 do 4 liste, plazečo pirnico in druge večletne trave pa pri višini približno 15 do 20 cm.

Opombe: ČU – čas uporabe, VVOI- najozje vodovarstveno območje.

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	NAČIN UPORABE	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L ali kg/ha)	KARENCA/OPOMBE
Enoletni ozkolistni in širokolistni pleveli	Pred vznikom krompirja in plevelov	aklonifen	Chanon	3 L/ha	ČU
			Challenge	4 L/ha	90
			Challenge 600	4 L/ha	90
		flufenacet + metribuzin		Plateen WG 41,5	2 - 2,5 kg/ha
	klomazon		Angelus	0,25 L/ha	ČU

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	NAČIN UPORABE	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L ali kg/ha)	KARENCA/OPOMBE
			Clomate	0,25 L/ha	ČU
		klomazon + metobromuron	Sinopia	3 L/ha	ČU
		klomazon + metribuzin	Metric	1 - 1,5 L/ha	ČU. <b>Prepovedan na VVOI.</b>
		metobromuron	Proman	3 L/ha	ČU
		pendimetalin	Sharpen 33 EC	3 - 5 L/ha	ČU
			Sharpen plus	2,5 - 4 L/ha	ČU
			Stomp Aqua	2,9 L/ha	ČU
		pendimetalin + klomazon	Stallion sync tec	3 L/ha	ČU
		prosulfokarb	Boxer	5 L/ha	ČU
		metribuzin	Buzzin	0,75 kg/ha	ČU. <b>Prepovedan na VVOI.</b>
			Sencor SC 600	0,75 kg/ha	42; 1X; tretiranje pred vznikom. <b>Prepovedan na VVOI.</b>
			Sencor SC 600	0,15	42; Po vzniku krompirja v času ko je plevel v fazi ključnih listov do 2 razvitih pravih listov. V primeru naknadnega vznika plevela se tretiranje ponovi z enakim odmerkom. Interval med tretiranjii naj znaša od 10 do 14 dni, najpozneje do stadija, ko ima rastlina na glavnem stebelu razvitih devet listov (do BBCH 19). <b>Prepovedan na VVOI.</b>
Enoletni in večletni ozkolistni pleveli	Po vzniku krompirja in plevelov	cikloksidim	Focus ultra	1 - 4 L/ha	56
		propakvizafop	Agil 100 EC	0,75 - 1,5 L/ha	30
			Zetrola	0,75 - 1,5 L/ha	30
		kvilazafop- p-butill	Targa Super	1,2 - 2 L/ha	45
		kletodim	Select super	1 - 2,5 L/ha	56
		fluazifop-p-butill	Fusilade forte	0,8 - 1,3 L/ha	90
			Fusilade max	1,6 L/ha	90
Enoletni ozkolistni in nekateri večletni širokolistni pleveli	Po vzniku krompirja in plevelov	bentazon	Basagran 480	1,5 - 2 L/ha	ČU; Tretira se v času, ko je krompir visok največ 10 cm. <b>Prepovedan na VVOI.</b>
			Benta 480 SL	2 L/ha	ČU. <b>Prepovedan na VVOI.</b>
		rimsulfuron	Rim 25 WG	0,06 kg/ha	ČU; Z dodatkom močila v 0,1 % koncentraciji; ne sme se uporabljati v posevkih semenskega krompirja. <b>Prepovedan na VVOI.</b>

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	NAČIN UPORABE	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L ali kg/ha)	KARENCA/OPOMBE
Enoletni, dvoletni in večletni ozkolistni ter širokolistni plevel	Pred saditvijo V času do 5 dni po sejanju Pred spravilom – za sušenje cime	glifosat v obliki izopropilamino soli, glifosat v obliki kalijeve soli pelargonska kislina	Rimuron 25 WG	0,05 kg/ha	ČU; Z dodatkom močila HELM SURFER PLUS 0,2 L/ha; deljena (split) aplikacija: 30 g/ha + 20 g/ha; od fenološke faze, ko ima krompir vsaj 9 listov oz. je višji od 4 cm. Drugo tretiranje se izvede 8-10 dni po prvem, do začetka rasti glavnih stebel, ko je nižji od 20 cm (do BBCH 300). <b>Prepovedan na VVOI.</b>
			Rincon 25 SG	0,06 kg/ha	ČU. <b>Prepovedan na VVOI.</b>
			Tarot 25 WG	0,040 - 0,050 kg/ha	ČU; Obvezno z dodatkom močila! 40 g/ha + močilo za širokolistni in enoletni ozkolistni plevel, razen navadne kostrebe; 50 g/ha + močilo za širokolistni in enoletni ozkolistni plevel, vključno z navadno kostrebo in večletnim ozkolistnim plevelom. Treirati, ko je krompir od treh listov dalje in najpozneje na začetku sklepanja vrst, plevel pa ima razvite dva do tri liste. Če prevladuje širokolistni plevel sredstvo ni dovolj učinkovito! <b>Prepovedan na VVOI.</b>
			Clinic xtreme	1,33 - 4 L/ha 1,2 - 2 L/ha	ČU Za rastline, posajene v vrstah
			Beloukha	16 L/ha	ČU

## 10.7 INTEGRIRANO VARSTVO OLJNE OGRŠČICE PRED BOLEZNIMI IN ŠKODLJIVCI

Opombe: ČU – čas uporabe, VVOI- najozje vodovarstveno območje.

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	UKREPI	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L ali kg na ha)	KARENCA (dni)	OPOMBE, dovoljeno št. rab
<b>Bela zrnata gniloba ogrščice</b> ( <i>Sclerotinia</i> )	<b>Agrotehnični ukrepi:</b> - ustrezno kolobarjenje, - na vlažnih legah sejemo redkeje,	tebukonazol	Folicur EW 250 Orius 25 EW	0,5 L/ha 1 L/ha	56 56	Uporaba 2x v sezoni.

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	UKREPI	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L ali kg na ha)	KARENCA (dni)	OPOMBE, dovoljeno št. rab
<i>sclerotiorum</i> )	<p>- če imamo v kolobarju tudi sončnice, ogrščice ne uporabljamo za podorino.</p> <p>Glavno obdobje okužb je med cvetenjem in kmalu po cvetenju. Za velik razmah boleznij je potrebno deževno vreme od sredine aprila do sredine maja. Na lažjih tipih tal zatiranje ni potrebno, ker gliva tam na površju tal oblikuje le malo plodišč. V jesenskem času bele gnilobe v naših razmerah ne zatiramo. Zatiranje opravimo pred tik pred cvetenjem ali takoj po njem, če opazimo začetne pojave trohnenja spodnjih delov stebel pri več kot 5% rastlin. Pozno dognojevanje z dušičnimi gnojili in poškodbe od mraza čez zimo značilno povečajo stopnjo napada. Apnenje ogrščice v suhem vremenu tik pred začetkom rasti spomladi zmanjša napad, ker apno omeji razvoj apotecijskih plodišč na površini tal. Bolezen je pogostejša, če v posevkih nimamo urejenih voznih stez in ob vožnji veliko rastlin povozimo ter kadar se pojavi pomanjkanje kalcija in bora.</p>		Buzz Ultra DF	0,33 kg/ha	56	Uporaba le 1x v sezoni.
			Bounty	0,6 L/ha	63	
			Tebkin	1 L/ha	56	
			Mirador forte	1,5 – 2 L/ha	56	Uporaba le 1x v sezoni.
			Custodia	1 L/ha	ČU	Uporaba le 1x v sezoni.
			Ortiva	1 L/ha	21	Uporaba le 1x v sezoni.
			Tazer 250 SC	1 L/ha	66	
			Zaifra AZT 250 SC	1 L/ha	21	
			Mirador 250 SC	1 L/ha	21	
			Chamane	1 L/ha	21	
			Velostar	1 L/ha	21	
			Norios	1 L/ha	21	
			Sisam	0,8 L/ha	ČU	Uporaba le 1x v sezoni.
			Propulse	1 L/ha	56	Uporaba 2x v sezoni.
			Praktis	0,7 L/ha	56	Uporaba 2x v sezoni.
			Cactai	0,6 L/ha	ČU	
			Era (stara ime Tartaros 300 EC)	0,6 L/ha	ČU	
			Tartaros	0,6 L/ha	ČU	
			Protendo 300 SC	0,6 L/ha	56	
			Pecari 300 EC	0,6 L/ha	56	
			Procer 300 EC	0,6 L/ha	ČU	
			Promino 300 EC	0,6 L/ha	ČU	
			Revyona	2 L/ha	53	Uporaba 2x v sezoni.
	Royalty	0,5 kg/ha	ČU	Uporaba le 1x v sezoni.		
	Zenby	0,8 L/ha	ČU	Uporaba 1x v sezoni.		

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	UKREPI	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L ali kg na ha)	KARENCA (dni)	OPOMBE, dovoljeno št. rab
		<i>Pythium oligandrum</i> <i>Bacillus amyloliquifaciens</i> <i>Trichoderma asperellum</i> T34	Polyversum Serenade ASO Xilon	0,1 kg/ha 2 L/ha 10 kg/ha	1 dan oz. čas (način) uporabe ni potrebna ČU	Uporaba 2-3x v sezoni. Uporaba 2x v sezoni. Sredstvo se aplicira v vrste, 2-5 cm globoko. Sredstvo se aplicira neposredno za setveni kanal, izključno s sejalo opremo, ki ima dodatno nameščene aplikatorje za zadelavo (inkorporacijo) mikrogranul na ustrezno globino.
Suha trohnoba stebra ogrščice ( <i>Phoma lingam</i> )		tebukonazol	Folicur EW 250	0,5- 1 L/ha	56	Uporaba 2x v sezoni.
			Orius 25 EW	1 L/ha	56	
			Tebusha 25% EW	1 L/ha	60	
			Tebkin	1 L/ha	56	Uporaba 1x v sezoni. Ozimno oljno ogrščico se lahko tretira samo v spomladanskem času.
			Mirador forte	1,5 -2 L/ha	56	Uporaba le 1x v sezoni.
			Plexeo	1,2 L/ha	56	Uporaba 2x v sezoni.
		azoksisstrobin + tebukonazol metkonazol	Caramba Sirena	1,2 L/ha 1,2 L/ha	56 56	

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	UKREPI	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L ali kg na ha)	KARENCA (dni)	OPOMBE, dovoljeno št. rab
Alterarijska črnoba, pegavost in gniloba ogrščice ( <i>Alternaria brassicae</i> spp.)	<p><b>Agrotehnični ukrepi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hitro zaoravanje ostankov,</li> <li>- preprečevanje razvoja samosevcev.</li> </ul>	difenokonazol	Score 250 EC	0,5 L/ha	3	Uporaba 2x v sezoni.
		azoksistrobin	Mavita 250 EC	0,5 L/ha	3	
			Zafra AZT 250 SC	1 L/ha	21	Uporaba le 1x v sezoni.
			Mirador 250 SC	1 L/ha	21	Uporaba le 1x v sezoni.
			Ortiva	1 L/ha	21	Uporaba le 1x v sezoni.
			Propulse	1 L/ha	56	Uporaba 2x v sezoni.
			Revyona	1,5 L/ha	53	Uporaba 2x v sezoni.
			Era (staro ime Tartaros 300 EC)	0,6 L/ha	ČU	Uporaba 2x v sezoni.
			Cactai	0,6 L/ha	ČU	
			Tartaros	0,6 L/ha	ČU	
			Protendo 300 EC	0,6 L/ha	56	
			Pecari 300 EC	0,6 L/ha	56 i	
			Procer 300 EC	0,6 L/ha	ČU	
			Promino 300 EC	0,6 L/ha	ČU	
			<i>Pythium oligandrum</i>	Polyversum	0,1 kg/ha	1 dan oz. čas (način) uporabe
	<p><b>Tehnika zatiranja:</b> Osnovna oblika zatiranja boleznij je uporaba razkuženega semena. Če se bolezen pojavi v večjem obsegu moramo pridelovanje križnic začasno ustaviti. Fungicidi, ki se jih uporabi proti beli rznati gnilobi imajo stranski učinek tudi na to bolezen. K zmanjšanju pojava boleznij prispeva poznejša setev sort, ki so bolj robustne in odporne na zimsko poleganje in mraz. Zatiranje repičnega bolhača tudi vpliva k zmanjšani stopnji napada. V deževnih jesenih in ob zgodnjih dobro opaznih znakih se uporabi priprave na podlagi tebukonazola. Največja potreba po varovanju se pojavi v semenskih posevkih, če imamo v kolobarju še veliko drugih križnic.</p>					
		fluopiram +protiokonazol boskalid	Propulse	1 L/ha	56	Uporaba 2x v sezoni. (alternarija)
		difenokonazol	Royalty	0,5 kg/ha	ČU	Uporaba le 1x v sezoni. (alternarija)
		tebukonazol	Score 250 EC	0,5 L/ha	3	Uporaba 2x v sezoni. (alternarija)
			Mavita 250 EC	0,5 L/ha	3	
			Folicur EW 250	0,5 L/ha	56	Uporaba 2x v sezoni.

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	UKREPI	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L ali kg na ha)	KARENCA (dni)	OPOMBE, dovoljeno št. rab
			Orius 25 EW	1 L/ha	56	sezoni. (alternarija) Uporaba 2x v sezoni. (alternarija, siva plesen)
			Tebkin	1 L/ha	56	Uporaba 1x v sezoni. Ozimno oljno ogrščico se lahko tretira samo v spomladanskem času.
<b>Siva plesen</b> ( <i>Botrytis cynerea</i> )		azoksistrobin + tebukonazol	Mirador forte	1,5 -2 L/ha	56	Uporaba le 1x v sezoni. (alternarija, siva plesen)
		azoksistrobin	Ortiva	1 L/ha	21	Uporaba le 1x v sezoni. (alternarija)
			Tazer 250 SC	1 L/ha	66	
			Zaftra AZT 250 SC	1 L/ha	21	
			Mirador 250 SC	1 L/ha	21	
			Chamane	1 L/ha	21	
			Velostar	1 L/ha	21	
			Norios	1 L/ha	21	
			Protendo 300 SC	0,6 L/ha	56	Uporaba 2x v sezoni. (alternarija)
			Pecari 300 EC	0,6 L/ha	56	
			Revyona	1,5 L/ha	53 d	Uporaba 2x v sezoni. (alternarija)
			<i>Pythium oligandrum</i>	Polyversum	0,1 kg/ha	1 dan oz. čas (način) uporabe
<b>Golšavost kapusnic</b> ( <i>Plasmodiophora brassicae</i> )						<b>Tehnika zatiranja:</b> Alternarijsko črnobo se zatira hkrati z zatiranjem bele zmate gnilobe. Primerno je škropiti tik po cvetenju, ker se tako bolje obvaruje luske, ki so najbolj pomembna točka varovanja. Gliva je splošno razširjena in stalno prisotna. Težave z močnimi pojavi so v letih, ko imamo zelo deževen in topel začetek poletja. Hkrati s črnobo se v takšnih letih pojavi tudi siva plesen. Ta pri gostem sklopu napade stebela, množično pa tudi luske, ki so bili poškodovani od škodljivcev.
						<b>Tehnika zatiranja:</b> Golšavosti v ogrščici s kemičnimi metodami se ne zatira. Na kislih tleh se skuša popraviti prenikzo reakcijo tal z apnenjem, ki se ga delno izvede pred setvijo, delno pa spomladi pred začetkom rasti. Mnogo oslabiljenih rastlin ne prapade popolnoma, zato okužbe nekaj odstotkov rastlin navadno ne vplivajo značilno na pridelek. Če se pogosto prideluje druge križnice in se pojavijo težave zaradi povečanih okužb je treba določiti, katero križnico se bo vsaj za 4 do 5 let izločilo iz kolobarja.

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	UKREPI	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L ali kg na ha)	KARENCA (dni)	OPOMBE, dovoljeno št. rab
<b>Plesen križnic in ogrščična plesen</b> ( <i>Peronospora parasitica</i> , <i>Peronospora brassicae</i> )	<b>Tehnika zatiranja:</b> V naših razmerah se plesen redno pojavi na posameznih rastlinah v jeseni in spomladi. Močni napadi so redki, zato zatiranje ni potrebno. Pri zgodnjih, preveč gostih setvah se gliva pojavi, če pade v septembru veliko dežja in so posevki ogrščice v neposredni bližini večjih njiv z zeljem. Napadeni listi odmrjejo že jeseni nato pa se razvoj gliv s prihodom mraza ustavi. V nekaterih letih je plesen nevarna v pregostih semenskih posevkih, ker napade tudi luske. Velika nevarnost okužb po cvetenju obstaja, če je v posevku veliko divje redkve in gorjušice, ki sta pomemben vir kužila. Pripravkov za kemično zatiranje te plesni pri nas nimamo.					
<b>Pepelasta plesen križnic</b> ( <i>Erysiphe communis</i> , <i>Erysiphe cruciferarum</i> )	<b>Tehnika zatiranja:</b> Zatiranje pepelaste plesni v naših razmerah ni potrebno. Kljub temu, da se jeseni redno pojavlja, se spomladi v ustrezno gostih posevkih ne razvije v velikem obsegu. Če se za zatiranje drugih boleznih uporabi pripravke na podlagi tebukonazola, se lahko plesen uspešno kemično zatire.					
<b>Bela rja križnic</b> ( <i>Albugo candida</i> )	<b>Tehnika zatiranja:</b> Te bolezni v naših razmerah ni potrebno zatirati. Delno lahko prizadene posevke oljne ogrščice na območjih, kjer pogosto gojijo semenske posevke gorjušice in redkve.					
<b>Cilindrosporioza</b> ( <i>Cylindrosporium concentricum</i> )	Zatiranje v trenutnih razmerah ni potrebno, potreben pa je nadzor nad pojavljanjem.					
<b>Siva pegavost stebel</b> ( <i>Pseudocercospora capsellae</i> )						
<b>Oglata pegavost križnic</b> ( <i>Micosphaerella brassicae</i> )						
<b>Repični bolhač</b> ( <i>Psylliodes chrysocephala</i> )		tau-fluvalinat	Mavrik 240	0,2 L/ha	60	
			Evure	0,2 L/ha	60	
		deltametrin	Decis 100 EC	63 mL/ha	45	
			Decis 2,5 EC	0,3 L/ha	45	
		lambda-cihalotrin	Karate zeon 5 CS	0,15 L/ha	28	
		cipermetrin	Columbo 0,8 MG	12 kg/ha	ČU	
	<b>Tehnika zatiranja:</b> Kljub temu, da so populacije repičnega bolhača pogosto velike, zatiranje ni vedno smiselno. Če se ogrščico poseje v ustreznem terminu (dovolj zgodaj) in se rastline hitro razvijajo, hrošči z objedanjem ne morejo povzročiti toliko poškodb, da bi rastline zaradi tega propadle. Prag za zatiranje hroščev v stadiju ključnih listov je presežen, če se opazi več kot 50 % rastlin z več kot dvema izjedama na ključnih listih. Nekoliko poznejše zatiranje hroščev je smiselno v toplih jesenih. Zatiranje bolhača se skuša združiti z zatiranjem repne grizlice. Z nekoliko poznejšim zatiranjem se združijo zatiranje bolhača in gosenic sovk. Če se zatire hrošče se prepreči odlaganje jajčec in razvoj ličink, ki se jih v oktobru veliko težje zatire, kot hrošče.					
<b>Repičar</b>		lambda-cihalotrin	Karate Zeon 5 CS	0,15 L/ha	28	

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	UKREPI	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L ali kg na ha)	KARENCA (dni)	OPOMBE, dovoljeno št. rab
<i>(Meligethes aeneus)</i>		deltametrin	Decis 2,5 EC	0,3 L/ha	45	
			Decis 100 EC	0,075 L/ha	45	
			Poleci	0,3 L/ha	45	
		tau-fluvalinat	Delux 050 CS	0,1 L/ha	56	
			Mavrik 240	0,2 L/ha	60	
			Evure	0,2 L/ha	60	
	<b>Tehnika zatiranja:</b> Potrebo po zatiranju se ugotovi na podlagi pregleda velikosti populacije hroščev in na podlagi ocene dinamike odpiranja cvetov. Zatiranje se izvede najpozneje tik pred začetkom cvetenja. Velikost populacije hroščev se lahko ugotovi z ulovom v rumene posode, napolnjene z vodo ali pa s štejem števila hroščev na posameznih vejah socvetja. Zatiranje ima stranski učinek na klijunotaje. Prag škodljivosti je presežen, kadar je povprečno na posameznih rastlinah 1-2 hrošča v času razpiranja brstov (brsti zavarovani z lističi), ali kadar so 2 –3 hrošči na rastlino v času nabreklih cvetnih brstov ali 4 – 6 hroščev na rastlino v času nekaj dni pred razcvetenjem prvih cvetov. V času cvetenja postane repičar opráševalec. V času cvetenja se ne uporablja insekticidov zaradi varovanja čebel. Insekticidi se uporabijo, ko so preseženi pragovi škodljivosti in ob napovedi Javne službe zdravstvenega varstva rastlin. Pri piretroidih se upošteva pH škropilne brozge, ki naj bo okoli 6,5. Priporoča se, da se škropi v večerno nočnem času.					
<b>Kapovski bolhači</b> <i>(Phyllotreta sp.)</i>						
<b>Repični klijunotaj</b> <i>(Ceutorhynchus napi)</i>		lambda-cihalotrin	Karate Zeon 5 CS	0,15 L/ha	28	
		tau-fluvalinat	Mavrik 240	0,2 L/ha	60	
		deltametrin	Evure	0,2 L/ha	60	
			Decis 2,5 EC	0,3 L/ha	45	
	<b>Tehnika zatiranja:</b> Če se pojavijo velike populacije repičnega klijunotaja (veliko vbodnih mest) je treba zatiranje repičnega klijunotaja opraviti ločeno od zatiranja repičarja, sicer pa ne. V nekaterih letih je združeno zatiranje možno, v nekaterih pa ne. V času pred začetkom bujne rasti socvetja znaša kritično število povprečno dva vboda na posamezno rastlino ali 2 – 4 hroščki na 10 rastlin. Če se hrošče lovi z rumenimi posodami je prag zatiranja 5 hroščev/posodo na 3 dni.					
<b>Semenski kapusov klijunotaj</b> <i>(Ceutorhynchus assimilis)</i> <b>Luskova hrčica</b> <i>(Dasineura brassicae)</i>		lambda-cihalotrin	Karate Zeon 5 CS	0,15 L/ha	28	
		tau-fluvalinat	Mavrik 240 - A	0,2 L/ha	60	
		deltametrin	Evure - A	0,2 L/ha	60	
			Decis 2,5 EC	0,3 L/ha	45	

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	UKREPI	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L ali kg na ha)	KARENCA (dni)	OPOMBE, dovoljeno št. rab
<b>Mokasta kapusova uš</b> ( <i>Brevicorine brassicae</i> )	<b>Tehnika zatiranja:</b> Hrošče redkvinnega kijunotaja, odrasle hrčice in zgodnje uši se delno zatire ob zatiranju repičarja. Višek leta prve generacije hrčic je v sredini cvetenja, zato zatiranje v tistem obdobju ni mogoče. Del hroščkov kijunotaja se pojavi po cvetenju, kljub temu pa v naših razmerah uporaba insekticidov po cvetenju ni ekonomsko upravičena. Dodatno zatiranje po cvetenju bi bilo smiselno le v semenskih posevkih, če bi na posamezni rastlini povprečno našli več kot dva hroška redkvinnega kijunotaja.					
<b>Brazdasti kijunotaj</b> ( <i>Ceutorrhynchus pleurostigma</i> )		Enaki pripravki, ki se jih uporablja za zatiranje repičnega kijunotaja in repičnega bolhača.				
	<b>Tehnika zatiranja:</b> Zatiranje poletne rase brazdastega kijunotaja se skuša združiti z zatiranjem repičnega bolhača v jesenskem času. Če sejemo pilirano seme, ki je obdelano z insekticidi je ogrščica dokaj dobro obvarovana tudi pred napadom ličink brazdastega kijunotaja v septembru in oktobru.					
<b>Stebelni kapusov kijunotaj</b> ( <i>Ceutorrhynchus quadridens</i> )	Zatiranje stebelnega kapusovega kijunotaja se združi z zatiranjem repičnega kijunotaja. Kot kritično število za zatiranje se uporabi prag, ko se v posevku pojavijo več kot 2 - 3 hrošči na m <sup>2</sup> . Če se hrošče lovi z rumenimi posodami je prag zatiranja <b>15 hroščev/posodo/ 3 dni</b> .					
<b>Repna grizlica</b> ( <i>Athalia rosae</i> )		lambda-cihalotrin	Karate Zeon 5 CS	0,15 L/ha	28	
		deltametrin	Decis 2,5 EC	0,3 L/ha	45	
<b>Belini</b> ( <i>Pieris brassicae</i> , <i>Pieris rapae</i> , <i>Pieris napi</i> )	<b>Tehnika zatiranja:</b> Potreba po zatiranju je odvisna predvsem od skladnosti razvoja ogrščice in pojava pagosenic. Ob zgodnjem pojavu, ko ima ogrščica prva dva lista znaša prag 20 pagosenic na m <sup>2</sup> , pozneje, ko ima ogrščica 4 dobro razvite liste znaša <b>prag 1</b> pagosenica na rastlino. Če so v bližini posevkov ogrščice neobdelana strnišča na katerih raste veliko samosevcev ali divjih križnic (npr. potočarke), se lahko pričakuje selitev pagosenic z njih na posevek ogrščice. Možno je tudi prehajanje s posevkov strniščne repe. Hkrati z zatiranjem grizlice se opravi zatiranje gosenic belinov (rumeno zelene gosenice).					

#### 10.8 INTEGRIRANO VARSTVO OVLJNE OGRŠČICE PRED PLEVELI

**Za zatiranje plevelov je v integrirani pridelavi treba izvesti vsaj en ukrep brez kemične aplikacije letno (slepa setev, uporaba česal, okopavanje, termično zatiranje plevelov-plamen, vodna para ipd.) ali aplikacijo herbicidov samo v vrste.**

V ogrščici imamo dva obdobja zatiranja plevelov, jesensko in zgodnje spomladansko. V našem okolju prevladuje sistem zatiranja plevelov jeseni. Če se seje ogrščico zgodaj lahko jesensko zimski pleveli povzročijo zastoj razvoja ogrščice že v jesenskem obdobju. Njivo za setev se lahko pripravi zgodaj in se ne seje takoj, temveč se jo pusti, da pleveli vzniknejo in se jih nato prebrana (slepa setev). Tako se izvede mehanično zatiranje plevelov. Na njivah z majhnim

potencialom plevelov uporaba herbicidov sploh ni potrebna, če se opravi setev v optimalnih pogojih in jeseni nastopi zgodnji mraz. V primeru uporabe česal mora biti izvedena setev v vrste.

Če se odloči za zatiranje z uporabo napropamida, se ga mora pred setvijo plitvo vdelati (inkorporirati) v tla. Postopek inkorporacije se izrabi za mehanično zatiranje plevelov, kot je omenjeno zgoraj. Samosevci se v septembru zelo hitro razvijajo in lahko močno zavrejo razvoj ogrščice. Po vzniku se jih hkrati z drugimi nevarnimi travami (srakoperec, stoklase, pirnica, ...) zatre z graminicidi.

Opombe: ČU – čas uporabe, VVOI- najnižje vodovarstveno območje. Pri sredstvih je potrebno upoštevati varnostni pas do voda – glejte navodila za uporabo!

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	NAČIN UPORABE	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L ali kg/ha)	KARENCA/OPOMBE		
Širokolistni in ozkolistni pleveli	Pred vznikom plevelov in ogrščice (možna uporaba tudi po vzniku ogrščice)	metazaklor	Butisan 400 SC (uporaba samo po vzniku)	2,5 L/ha	ČU; Na osnovi aktivne snovi metazaklor se v odmerku 1 kg aktivne snovi na ha smejo uporabljati na istem zemljišču samo vsako tretje leto. <b>Prepovedan na VVOI.</b>		
			Butisan S	2 L/ha			
			Rapsan 500 SC	2 L/ha			
			Fuego (uporaba samo po vzniku)	1,5 L/ha			
		kvinmerak + metazaklor	Fuego top	2 L/ha	ČU; Na osnovi aktivne snovi metazaklor se v odmerku 1 kg aktivne snovi na ha smejo uporabljati na istem zemljišču samo vsako tretje leto. <b>Prepovedan na VVOI;</b>		
		metazaklor + imazamoks		Cleranda (v hibridih oljne ogrščice označene kot CLEARFIELD®)		2 L/ha	ČU; <b>Prepovedan na VVOI.</b> <b>Zaloge v uporabi do 31.1.2025</b>
		napropamid		DevrinoI 45 FL		2,5 l / ha	ČU; Plitka zadelava v tla pred setvijo.
						2,5 L/ha	
dimetaklor		Teridox 500 EC		2,0 L/ha	ČU; <b>Prepovedan na VVOI.</b>		
petoksamid		Successor 600		2 l/ha	Čas uporabe. <b>Prepovedan na VVOI.</b>		
klopiralid		Lontrel 72 SG		0,17 kg/ha	ČU; <b>Prepovedan na VVOI. Uporaba izključno po vzniku!</b> 120; <b>Prepovedan na VVOI.</b>		
				0,4 L/ha			
				0,167 kg/ha			
klomazon		Clap (ozimna oljna ogrščica)		0,3 – 0,4 L/ha	ČU; <b>Prepovedan na VVOI.</b> Na isti površini se priporoča uporaba sredstva vsake tri leta. <b>Prepovedan na VVOI.</b>		
				0,25 L/ha			
			Major 300 SL				
			Centium 36 CS				

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	NAČIN UPORABE	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L ali kg/ha)	KARENCA/OPOMBE
			Clomate	0,33 L/ha	
			Czar	0,25 L/ha	
			Angelus	0,33 L/ha	
		kvinmerak + imazamoks	Cleravo (v hibridnih oljne ogrščice označene kot CLEARFIELD®)	1 L/ha	ČU; Zaloga v uporabi do 31.1.2025.
		halauksifen-metil + pikloram	Belkar	0,25-0,5 L/ha	ČU; Uporablja se po vzniku plevela in ogrščice (širokolistni pleveli).
Ozkolistni pleveli	Po vzniku plevelov in ogrščice	fluazifop-p-butil	Fusilade forte	0,8 – 1,3 l / ha	90
			Fusilade max	1,6 L/ha	90
			Frequent	2 – 3 L/ha	90
			Agil 100 EC	0,75 – 1,5 l / ha	90
			Alive	1,2 L/ha	90; v ozimni in jari oljni ogrščici
			Zetrola	0,75 – 1,5 l / ha	90
			Focus ultra	1 – 4 l / ha	ČU
			Quick 5 EC	1 – 2 L/ha	ČU
			Targa super	1,2 - 2,5 L/ha	90
			Wish top	0,625 – 1,17 L/ha	90
		Digator	0,6 - 1,0 L/ha	75 dni oz. ČU	
		Select super	1 L/ha	120	
Eneletni, dvoletni in večletni ozkolistni in širokolistni plevel	Pred ali po setvi, pred vznikom posevka	glifosat v obliki izopropilamino soli + glifosat v obliki kalijeve soli	Clinic xtreme (staro ime Credit xtreme)	1,2 - 4 L/ha	Čas oz. način uporabe
		glifosat v obliki azoksistrobin	BMQ super	1,5 L/ha	Čas oz. način uporabe
		izopropilamino soli			

## 10.9 INTEGRIRANO VARSTVO KRMNE PESE PRED BOLEZNIMI IN ŠKODLJIVCI

Opombe: ČU – čas uporabe, VVOI- najozje vodovarstveno območje. Pri sredstvih je potrebno upoštevati varnostni pas do voda – glejte navodila za uporabo!

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	UKREPI	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L ali kg na ha)	KARENCA (dni)	OPOMBE, dovoljeno št. rab
Pesna listna		azoksistrobin	Ortiva	1 L/ha	14	Uporaba 3x v

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	UKREPI	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L ali kg na ha)	KARENCA (dni)	OPOMBE, dovoljeno št. rab
pegavost ( <i>Cercospora beticola</i> )			Mirador	1 L/ha	14	sezoni Uporaba 3x v sezoni
			Zaftra AZT 250 SC	1 L/ha	14	Uporaba 3x v sezoni
Siva pesna listna pegavost ( <i>Ramularia beticola</i> )		difenokonazol	Score 250 EC	0,4 L/ha	28	Uporaba 2x v sezoni
			Mavita 250 EC	0,4 L/ha	28	Uporaba 2x v sezoni
			Revystar XL	1 L/ha	28	Uporaba 2x v sezoni
			Revystar XL	1 L/ha	28	Uporaba 2x v sezoni
Pesna rja ( <i>Uromyces betae</i> )		difenokonazol	Score 250 EC	0,4 L/ha	28	Uporaba 2x v sezoni
			Mavita 250 EC	0,4 L/ha	28	Uporaba 2x v sezoni
Pesna pepelasta plesen ( <i>Erysiphe betae</i> )		fluksapiroksad + mefentriflukonazol	Revystar XL	1 L/ha	28	Uporaba 2x v sezoni
			Ortiva	1 L/ha	14	Uporaba 3x v sezoni
		azoksistrobin	Mirador	1 L/ha	14	Uporaba 3x v sezoni
			Zaftra AZT 250 SC	1 L/ha	14	Uporaba 3x v sezoni
		difenokonazol	Score 250 EC	0,4 L/ha	28	Uporaba 2x v sezoni
			Mavita 250 EC	0,4 L/ha	28	Uporaba 2x v sezoni
Listne pegavosti ( <i>Alternaria</i> sp.)		azoksistrobin	Revystar XL	1 L/ha	28	Uporaba 2x v sezoni
			žveplo	5 L/ha	3	Uporaba 2x v sezoni
			Ortiva	1 L/ha	14	Uporaba 3x v sezoni
			Mirador	1 L/ha	14	Uporaba 3x v sezoni
			Zaftra AZT 250 SC	1 L/ha	14	Uporaba 3x v sezoni

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	UKREPI	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L ali kg na ha)	KARENCA (dni)	OPOMBE, dovoljeno št. rab sezoni
<b>Pesni bolhač</b> ( <i>Chaetocnema tibialis</i> )	<b>Agrotehnični ukrepi:</b> Posevke pese, repe in drugih gostiteljskih rastlin se zasnuje čim dlje od starih, lanskoletnih posevkov. Zgodnjemu napadu škodljivca se izogne z zgodnejšo setvijo in izbiro zgodnjih sort, ki hitro razvijejo dovolj listne mase. Z izvajanjem ustreznih agrotehničnih ukrepov se skrbi za hiter mladostni razvoj rastlinic, da čim prej preidejo kritično fazo od kotiledona do razvoja prvih štirih pravih listov. Z vizualnim pregledovanjem rastlin na prisotnost pesnih bolhačev se prične takoj po vzniku posevka, pri čemer se pregleda najmanj 100 do 200 rastlin. V fazi kličnih listov je <b>prag škodljivosti</b> presežen, če se v povprečju najde več kot 2 poškodbi na rastlino, ob razvoju prvega para pravih listov pa 3-4 poškodbe na list. Pojav škodljivca se lahko spremlja tudi s pomočjo lepilnih plošč, ki se jih postavi takoj po vzniku. Hrošči so še posebej aktivni v toplih in sončnih dneh. <b>Kritično število:</b> 5 do 8 hroščev na dolžinski meter vrste posevka	lambda-cihalotrin	Karate Zeon 5 CS	0,15 L/ha	15	
<b>Kapusova sovka</b> ( <i>Mamestra brassicae</i> ) <b>Zelenjadna sovka</b> ( <i>Mamestra oleracea</i> ) <b>Glagolka</b> ( <i>Autographa gama</i> )	<b>Agrotehnični ukrepi:</b> Gosenice imajo raje posevke z bujnim listjem kjer se dalj časa zadržuje vlaga, zato pretirano gnojenje posevkov z N ni dopustno.	lambda-cihalotrin	Karate Zeon 5 CS	0,15 L/ha	15	
<b>Pesna muha</b> ( <i>Pegomya hyoscyami</i> )	<b>Kritično število:</b> - pesa v stadiju dveh pravih listov: 2 jajčeci ali ličinki na rastlino - pesa v stadiju štirih pravih listov: 6 jajčec ali ličink na rastlino - pesa v stadiju šestih listov: 10 jajčec ali ličink na rastlino.	lambda-cihalotrin	Karate Zeon 5 CS	0,15 L/ha	15	
<b>Črna fižolova uš</b> ( <i>Aphis fabae</i> ) <b>Siva breskova uš</b> ( <i>Myzus persicae</i> )	<b>Kritično število:</b> - črna fižolova uš: redke uši na 30 % rastlin, - sivo breskovo uš: 3 uši na 10 rastlin.	lambda-cihalotrin pirimikarb	Karate Zeon 5 CS Pirimor 50 WG	0,15 L/ha 0,5 kg/ha	15 7	
<b>Talni škodljivci strune</b> (Elateridae) <b>ogrci različnih hroščev</b> <b>ličinke košeninarjev</b> ( <i>Tipula</i> spp.)		teflutrin	Force 20 CS	0,06 l (na SE enoto)	ČU	Seme se sme tretirati s FFS le v napravah za razkuževanje semena, skladnih s predpisi, ki urejajo naprave za nanašanje FFS. Seme smejo tretirati samo fizične in pravne osebe, ki so vpisane v register dobaviteljev v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, in sicer za opravljanje dejavnosti »priprava za trg semena pojščin in zelenjadnic«.

## 10.10 INTEGRIRANO VARSTVO KRMNE PESE PRED PLEVELI

Za zatiranje plevelov je v integrirani pridelavi treba izvesti vsaj en ukrep brez kemične aplikacije letno (slepa setev, uporaba česal, okopavanje, termično zatiranje plevelov-plamen, vodna para ipd.) ali aplikacijo herbicidov samo v vrste.

Krmna pesa je do sklenitve vrst precej nekonkurenčna plevelom. Po sklenitvi vrst lahko konkurira s pleveli z nižjim habitusom, slabo pa je konkurenčna z višjimi pleveli kot so npr. ščiri, metlike, dresni, navadna ambrozija, baržunasti oslez idr. Pri varstvu pred pleveli je lahko v precejšnji pomoč metoda slepe setve (do setve tla večkrat plitvo obdelamo, da spodbudimo kalitev enoletnih plevelov, ki jih s predsetvenikom uničimo), med vegetacijo pa so pri zatiranju plevelov pomembni postopki mehanskega zatiranja z okopavanjem. Večletne – trajne plevelve je z uporabo nekemičnih postopkov varstva na večjih površinah zelo težko zatreti, zato jih je potrebno zatirati že v predposevkih ali na strnišču. Pri varstvu krmne pese pred enoletnimi pleveli se pri kemičnem zatiranju lahko poslužuje metoda uporabe herbicidov izključno po vzniku. Ob usmerjenem zatiranju plevelov, z večkratno rabo majhnih odmerkov herbicidov v zgodnjih razvojnih stadijih plevelov (stadij kličnih listov-KL), se zmanjša skupna potrebna količina herbicidov.

Opombe: ČU – čas uporabe, VVOI- najozje vodovarstveno območje.

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	NAČIN UPORABE	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L ali kg na ha)	KARENCA; OPOMBE
Enoletni, dvoletni in večletni ozkolistni ter širokolistni pleveli	Pred ali po setvi, pred vznikom posevka	glifosat v obliki izopropilamino soli + glifosat v obliki kalijeve soli	Cilnic xtreme (staro ime Credit xtreme)	1,2 – 4,0 L/ha	ČU; odmerek odvisen od časa uporabe (pred ali po setvi).
Enoletni širokolistni pleveli	Po setvi, pred in po vzniku posevka	metamitron	Goltix WG 90	Največji skupni odmerek je 3,9 kg/ha, uporaba v split – deljeni aplikaciji (3 x 1,3 kg/ha).	ČU; <b>Prepovedan na VVOI.</b>
Širokolistni pleveli	Po vzniku posevka		Bettix flo	Največji skupni odmerek je 5 L/ha, uporaba v split – deljeni aplikaciji.	ČU; <b>Prepovedan na VVOI.</b> Deljeni odmerki. Pleveli v kličnih listih.
Nekatere vrste širokolistnih plevelov			Metafol WG	Največji skupni odmerek je 5 kg/ha, uporaba v split – deljeni aplikaciji.	ČU; <b>Prepovedan na VVOI.</b> Deljeni odmerki. Pleveli v kličnih listih.
Nekatere vrste širokolistnih plevelov	Po vzniku posevka (BBCH 12-19)	klopiralid	Finex 700 SC	Uporaba v split - deljeni aplikaciji (3 x 1,65 L/ha).	ČU; <b>Prepovedan na VVOI.</b> Pleveli v kličnih listih.
Enoletni in večletni širokolistni pleveli	Po vzniku posevka (BBCH 12-14)		Lontrel 72 SG	0,17 kg/ha	ČU; <b>Prepovedan na VVOI.</b> Plevel v fazi od 2 do 6 listov.
			Clap	0,4 L/ha	80 dni; <b>Prepovedan na VVOI.</b> Na isti površini se priporoča uporaba sredstva

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	NAČIN UPORABE	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L ali kg na ha)	KARENCA; OPOMBE
Enoletni in večletni ozkolistni pleveli	Po vzniku posevka (BBCH 13-39)	propakvizafop	Agil 100 EC Zetrola	0,75 – 1,5 L/ha 0,75 – 1,5 L/ha	vsaka tri leta. 60 dni; aplikacija po vzniku plevelov. 60 dni; aplikacija po vzniku plevelov.
Enoletni in večletni ozkolistni pleveli in samosevci žit	Po vzniku posevka	cikloksidim	Focus ultra	1 - 4 L/ha	56 dni; aplikacija po vzniku plevelov.
Enoletni in večletni ozkolistni pleveli razen enoletne latovke ( <i>Poa annua</i> )		fluazifop – p- butil	Fusilade forte Fusilade max	0,8 – 2,5 L/ha 1-3 L/ha	56 dni; aplikacija po vzniku plevelov. 56 dni; aplikacija po vzniku plevelov.
Ozkolistni pleveli	Po vzniku posevka (BBCH 12-33)	kletodim	Select super	1 – 2,5 L/ha	56 dni; aplikacija po vzniku plevelov.
Enoletni ozkolistni pleveli in plazeča pirnica ( <i>Elymus repens</i> )	Po vzniku posevka (BBCH 12-39)	kvizafop-p-etil	Wish top	0,6 – 1,1 L/ha	90 dni; MANJŠA UPORABA. Aplikacija po vzniku plevelov.

## 10.11 INTEGRIRANO VARSTVO SLADKORNE PESE PRED BOLEZNIMI IN ŠKODLJIVCI

Opombe: ČU – čas uporabe, VVOI- najozje vodovarstveno območje.

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	UKREPI	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L ali kg na ha)	KARENCA (dni)	OPOMBE, dovoljeno št. rab
Pesna listna pegavost ( <i>Cercospora beticola</i> )	<b>Agrotehnični ukrepi:</b> - širok kolobar, - zmerno gnojenje z dušikom, - setev odpornejših sort, - globoko zaoravanje okuženih ostankov rastlin, - sladkorne pese ne sejemo v bližino lanskih pesič ali območij, kjer se je pridelovala krmna ali rdeča pesa.	difenokonazol	Score 250 EC	0,4 L/ha	28	Uporaba 2x v sezoni
		mefentriflukonazol	Mavita 250 EC	0,4 L/ha	28	Uporaba 2x v sezoni
		tetrakonazol	Revyona	1,5 L/ha	28	Uporaba 2x v sezoni
		fluksapiroksad+mefentriflukonazol	Eminent 125 EW	0,8 L/ha	30	Uporaba 1x v sezoni
		<i>Bacillus amyloliquifaciens</i> (former <i>subtilis</i> ) str. QST 713	Serenade ASO	2 L/ha	ni potrebna	Uporaba 2x v sezoni
Siva pesna listna pegavost ( <i>Ramularia beticola</i> )		mefentriflukonazol	Revyona	1,5 L/ha	28	Uporaba 2x v sezoni
		tetrakonazol	Eminent 125 EW	0,8 L/ha	30	Uporaba 1x v sezoni
		fluksapiroksad + mefentriflukonazol	Revystar XL	1 L/ha	28	Uporaba 2x v sezoni
		difenokonazol	Score 250 EC	0,4 L/ha	28	Uporaba 2x v sezoni
Pesna rja ( <i>Uromyces betae</i> )		mefentriflukonazol	Mavita 250 EC	0,4 L/ha	28	Uporaba 2x v sezoni
		difenokonazol	Revyona	1,5 L/ha	28	Uporaba 2x v sezoni
		mefentriflukonazol	Score 250 EC	0,4 L/ha	28	Uporaba 2x v sezoni
Pesna pepelasta plesen ( <i>Erysiphe betae</i> )		mefentriflukonazol	Mavita 250 EC	0,4 L/ha	28	Uporaba 2x v sezoni
		tetrakonazol	Revyona	1,5 L/ha	28	Uporaba 2x v sezoni
		difenokonazol	Eminent 125 EW	0,8 L/ha	28	Uporaba 2x v sezoni
		mefentriflukonazol	Score 250 EC	0,4 L/ha	28	Uporaba 2x v sezoni

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	UKREPI	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L ali kg na ha)	KARENCA (dni)	OPOMBE, dovoljeno št. rab
		žveplo	Microthiol SC	5 - 7,5 kg/ha	14	Uporaba 3x v sezoni
			Azumo	7,5 kg/ha	ČU	Uporaba 4x v sezoni
			Microthiol desperris	5 - 7,5kg/ha	ČU	Uporaba 4x v sezoni
			Microthiol special	5 - 7,5 kg/ha	10	Uporaba 2x v sezoni
			Pol-Sulfur 80 WG	6 - 7,5 kg/ha	ČU	Uporaba 4x v sezoni
			Sulfar	5 - 7,5 kg/ha	3	Uporaba 2x v sezoni
			Vertipin	5 L/ha	14	Uporaba 3x v sezoni
<b>Ožig pesnih kačkov</b> ( <i>Phyllum</i> sp.) rhizoctonia	<b>UKREPI</b> <b>Agrotehnični ukrepi:</b> - pomemben je ustrezan, vsaj štiriletni kolobar, - bolezen lahko omilimo z odvajanjem vode, izboljšanjem strukture tal, setvijo strniščnih dosevkov.					
<b>Gnitje korenov</b> ( <i>Rhizoctonia solani</i> )	Zatiranje boleznih s fungicidi ni učinkovito.					
<b>Bradatost korenov</b> <b>pese - rizomanija</b> (Beet Necrotic Yellow Vein Virus)	Učinkovitih ukrepov zatiranja ne poznamo.					
	<b>Agrotehnični ukrepi:</b> - upoštevanje širokega kolobarja (na površini, kjer se pojavi rizomanija je potrebno upoštevati vsaj 6-8 letni premor) - setev odpornejših sort na okuženih območjih.					
<b>Talni škodljivci</b> <b>strune</b> (Elateridae) <b>Ogrci različnih</b> <b>hroščev</b> <b>ličinke košeninarjev</b> ( <i>Tipula</i> spp.)	<b>Agrotehnični ukrepi:</b> - izogibanje večletnemu travinju kot predposevku (priporočena je setev sladkorne pese šele 3 leta po preoravanju), - večkratna obdelava tal, (priporočena je obdelava v suhem vremenu), - optimalni roki setve in sajenja. Uporaba z insekticidi tretiranega semena.	teflutrin	Force 20 CS*	0,06 l (na SE enoto)	ČU	
			Force Evo**	12 - 16 kg/ha	ČU	Manjša uporaba
			Diafstar maxi**	12 - 16 kg/ha	ČU	
		cipermetrin	Columbo 0,8 MG **	12 kg/ha	ČU	

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	UKREPI	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L ali kg na ha)	KARENCA (dni)	OPOMBE, dovoljeno št. rab
	<p><b>Opombi:</b></p> <p>*Seme se sme tretirati s FFS le v napravah za razkuževanje semena, skladnih s predpisi, ki urejajo naprave za nanašanje FFS. Seme smejo tretirati samo fizične in pravne osebe, ki so vpisane v register dobaviteljev v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, in sicer za opravljanje dejavnosti »priprava za trg semena poljščin in zelenjadnic«.</p> <p>** Tretiranje je dovoljeno samo v času setve oz. saditve s pomočjo posebnih dozirnih naprav (dozatorjev), ki se jih namesti na sadlnik oziroma na sejalnico in s katerimi se odmerja količina sredstva.</p>					
<b>Pesni bolhač</b> ( <i>Chaetocnema tibialis</i> )		deltametrin	Decis 100 EC	63 mL/ha	30	
		lambda-cihalotrin	Karate zeon 5 CS	0,15 L/ha	15	
		teflutrin	Force Evo**	12 - 16 kg/ha	ČU	Manjša uporaba
			DiaStar maxi**	12 - 16 kg/ha	ČU	
	<p><b>Prag škodljivosti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- v fazi ključnih listov: več kot 2 poškodbi na rastlino,</li> <li>- ob razvoju prvega para pravih listov: 3-4 poškodbe na list,</li> <li>- ulov na rumene lepilne plošč: 5 do 8 hroščev na dolžinski meter vrste posevka</li> </ul>					
	<p><b>Opomba:</b> **Tretiranje je dovoljeno samo v času setve oz. saditve s pomočjo posebnih dozirnih naprav (dozatorjev), ki se jih namesti na sadlnik oziroma na sejalnico in s katerimi se odmerja količina sredstva.</p>					
<b>Črna fižolova uš</b> ( <i>Aphis fabae</i> )		lambda-cihalotrin	Karate zeon 5 CS	0,15 L/ha	15	
		pirimikarb	Pirimor 50 WG	0,5 kg/ha	7	
<b>Siva breskova uš</b> ( <i>Myzus persicae</i> )						
	<p><b>Prag škodljivosti:</b> - črna fižolova uš: redke uši na 30 % rastlin, siva breskova uš: 3 uši na 10 rastlin</p>					
<b>Talne sovke</b> (Noctuide)	<p><b>Agrotehnični ukrepi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dosledno upoštevanje kolobarja, - če je le mogoče, naj bodo letošnji posevki sladkorne pese oddaljeni vsaj 1 km od lanskih, lanska pesišča pa naj bodo obdana z jarki, globokimi vsaj 30 cm (ravno dno, navpične stene),</li> <li>- izvajanjem vseh ukrepov, ki pomagajo rastlini, da hitro preide kritično obdobje razvoja, globoko jesensko oranje,</li> <li>- skrb za ohranjanje naravnih</li> </ul>	deltametrin	Decis 100 EC	75 mL/ha	30	

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	UKREPI	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L ali kg na ha)	KARENCA (dni)	OPOMBE, dovoljeno št. rab
	sovražnikov (ptic).					
	<b>Tehnika zatiranja:</b> Kritično število za okopavine sta 2 gosenici druge ali tretje razvojne stopnje na m <sup>2</sup> .					
<b>Veliki pesni rličkar</b> ( <i>Bothynoderes punctiventris</i> )	<b>Agrotehnični ukrepi:</b> - upoštevanje širokega kolobarja, - izvajanjem vseh ukrepov, ki pospešijo rast mladih rastlinic, - odsvetuje se prezgodnja setev. Kemično zatiranje je potrebno v primeru, da je presežen prag škodljivosti.	lambda-cihalotrin teflutrin	Karate zeon 5 CS Force evo	0,15 L/ha 12-16 kg/ha	15 Čas in način uporabe	Manjša uporaba
<b>Mahovinar</b> ( <i>Atomaria linearis</i> )						
	<b>Prag škodljivosti:</b> v času od vznika pese do razvojnega stadija 8 listov pese napadenih več kot 20% rastlin					
<b>Listne sovke</b> ( <i>Autographa gamma</i> , <i>Noctua</i> spp.)	<b>Agrotehnični ukrepi:</b> - gnojenje posevkov z N uskladimo z dejanskimi potrebami.	deltametrin	Decis 100 EC	75 mL/ha	30	
<b>Pesna muha</b> ( <i>Pegomya betae</i> )	<b>Agrotehnični ukrepi:</b> - upoštevanje širokega kolobarja, - škodljivost zmanjšamo z zgodnjo setvijo.	lambda-cihalotrin	Karate zeon 5 CS	0,15 L/ha	15	
<b>Pesni molj</b> ( <i>Scrobipalpa ocellatella</i> )	<b>Agrotehnični ukrepi:</b> - upoštevanje širokega kolobarja, - uničevanje ostankov rastlin po spravilu pridelka, - jesenska globoka obdelava tal, - namakanje.	lambda-cihalotrin deltametrin	Karate zeon 5 CS Decis 100 EC	0,15 L/ha 75 mL/ha	15 30	
	<b>Prag škodljivosti:</b> Vsaj 70 % rastlin napadenih s povprečno 4-5 gosenicami na rastlino (zatiranje je potrebno, če ne pričakujemo dežja). V slabo razvitem posevku 5 gosenic na rastlino na 50% rastlin (zatiranje je potrebno, če v naslednjih 10 dneh ne pričakujemo dežja).					
<b>Pesna ogorčica</b> <i>Heterodera schachtii</i>	<b>Agrotehnični ukrepi:</b> - kolobar, - kakovostna obdelava.					

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	UKREPI	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L ali kg na ha)	KARENCA (dni)	OPOMBE, dovoljeno št. rab
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zatiranje plevelov,</li> <li>- zgodnja setev,</li> <li>- na površinah, kjer so težave z ogorčicami, je priporočljiva setev rastlin, ki s svojimi izločki uničujejo parazita oziroma imajo sposobnost zmanjševanja okuženosti tal z ogorčicami.</li> </ul>					
<b>Polži</b> <i>Limacidae</i> <i>Gastropoda</i>	<p><b>Agrotehnični ukrepi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- čiščenje poti preko katerih prihajajo na parcelo in okolice njive,</li> <li>- kakovostna priprava setvenice,</li> <li>- obdelava tal v suhem poletju,</li> <li>- jesensko preoravanje površin,</li> <li>- zatiranje plevelov.</li> </ul>	metaldehid	Gusto3 - Polžomor Plantella arion Ecometal Ironmax pro Ferramol Solabiol proti polžem Polžomor bio vaba za zatiranje polžev	6 kg/ha 6 kg/ha 7 kg/ha 7 kg/ha 50 kg/ha 50 kg/ha 50 kg/ha	90 90 ČU ni potrebna ni potrebna ni potrebna ni potrebna	

## 10.12 INTEGRIRANO VARSTVO SLADKORNE PESE PRED PLEVELI

**Za zatiranje plevelov je v integrirani pridelavi treba izvesti vsaj en ukrep brez kemične aplikacije letno (slepa setev, uporaba česal, okopavanje, termično zatiranje plevelov-plamen, vodna para ipd.) ali aplikacijo herbicidov samo v vrste.**

Sladkorna pesa je do sklenitve vrst precej nekonkurenčna plevelom. Po sklenitvi vrst lahko konkurira s pleveli z nižjim habitusom, slabo pa je konkurenčna z višjimi pleveli kot so npr. ščiri, metlike, dresni, navadna ambrozija, baržunasti oslez idr. Pri varstvu pred pleveli je lahko v precejšnji pomoč metoda slepe setve (do setve se tla večkrat plitvo obdela, da se spodbudi kalitev enoletnih plevelov, ki se jih s predsetvenikom uniči), med vegetacijo pa so pri zatiranju plevelov pomembni postopki mehanskega zatiranja z okopavanjem. Večletne – trajne pleveli je z uporabo nekemičnih postopkov varstva na večjih površinah zelo težko zatreči, zato jih je potrebno zatirati že v predposevkih ali na strnišču. Pri varstvu sladkorne pese pred enoletnimi pleveli se pri kemičnem zatiranju lahko poslužuje metoda uporabe herbicidov izključno po vzniku. Ob usmerjenem zatiranju plevelov, z večkratno rabo majhnih odmerkov herbicidov v zgodnjih razvojnih stadijih plevelov (stadij kličnih listov-KL), se zmanjša skupna potrebna količina herbicidov.

Opombe: ČU – čas uporabe, VVOI- najžjeje vodovrstveno območje. Pri sredstvih je potrebno upoštevati varnostni pas do voda – glejte navodila za uporabo!

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	NAČIN UPORABE	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L ali kg na ha)	KARENCA; OPOMBE
Enoletni, dvoletni in večletni ozkolistni ter širokolistni pleveli	Pred ali po setvi, pred vznikom posevka	glifosat v obliki izopropilamino soli + glifosat v obliki kalijeve soli	Clinic xtreme (staro ime Credit xtreme)	1,2 – 4,0 L/ha	ČU; odmerek odvisen od časa uporabe (pred ali po setvi).

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	NAČIN UPORABE	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L ali kg na ha)	KARENCA; OPOMBE
Enoletni pleveli in samonikla žita	Po setvi, pred vznikom posevka	glifosat v obliki izopropilamino soli S-metolaklor	Bqtm super	1,5 L/ha	ČU
	Pred vznikom posevka		Dual gold 960 EC	0,8 – 1,2 L/ha	ČU; <b>prepovedan na VVOI.</b> Odmerek odvisen od tal. <b>Zaloge v uporabi do 23.7.2024.</b>
Enoletni ozkolistni in širokolistni pleveli			Efica 960 EC	0,8 – 1,2 L/ha	ČU; <b>prepovedan na VVOI.</b> Odmerek odvisen od tal. <b>Zaloge v uporabi do 23.7.2024.</b>
Enoletni širokolistni pleveli	Po setvi, pred in po vzniku posevka	metamitron	Goltix WG 90	Največji skupni odmerek je 3,9 kg/ha, uporaba v split – deljeni aplikaciji (3 x 1,3 kg/ha).	ČU; <b>prepovedan na VVOI.</b>
Širokolistni pleveli	Po vzniku posevka		Bettix flo	Največji skupni odmerek je 5 L/ha, uporaba v split – deljeni aplikaciji.	ČU; <b>prepovedan na VVOI.</b> Deljeni odmerki. Pleveli v ključnih listih.
			Metafol WG	Največji skupni odmerek je 5 kg/ha, uporaba v split – deljeni aplikaciji.	ČU; <b>Prepovedan na VVOI.</b> Deljeni odmerki. Pleveli v ključnih listih.
Nekatere vrste širokolistnih plevelov	Po vzniku posevka		Finex 700 SC	Uporaba v split - deljeni aplikaciji (3 x 1,65 L/ha).	ČU; <b>Prepovedan na VVOI.</b> Pleveli v ključnih listih.
	Po vzniku posevka (BBCH 12-19)	klopiralid	Lontrel 72 SG	0,17 kg/ha	ČU; <b>Prepovedan na VVOI.</b> Plevel v fazi od 2 do 6 listov.
Enoletni in večletni širokolistni pleveli	Po vzniku posevka (BBCH 12-19)		Clap	0,4 L/ha	80 dni; <b>Prepovedan na VVOI.</b> Na isti površini se priporoča uporaba sredstva vsaka tri leta.
Nekatere vrste širokolistnih plevelov	Po vzniku posevka. Prvo tretiranje se opravi v fazi od 2 do 4 razvitih listov (BBCH 12-14), ostali dve tretiranj pa po ponovnem vzniku plevela, v 6-10 dnevni razmaki med		Major 300 SL	0,3 – 0,4 L/ha ali deljen odmerek 3 x 0,2 L/ha	ČU; <b>Prepovedan na VVOI.</b> Na isti površini se priporoča uporaba sredstva vsaka tri leta. Omejite pri sajenju in setvi naslednjih kultur.

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	NAČIN UPORABE	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L ali kg na ha)	KARENCA; OPOMBE
	posameznimi tretiranj				
Enoletni in večletni ozkolistni pleveli	Po vzniku posevka (BBCH 13-39)	propakvizatop	Agil 100 EC	0,75 – 1,5 L/ha	60 dni; aplikacija po vzniku plevelov.
			Zetrola	0,75 – 1,5 L/ha	60 dni; aplikacija po vzniku plevelov.
Enoletni in večletni ozkolistni pleveli in samosevci žit	Po vzniku posevka	cikloksidim	Focus ultra	1 - 4 L/ha	56 dni; aplikacija po vzniku plevelov.
		fluazifop – p- butil	Fusilade forte Fusilade max	0,8 – 2,5 L/ha 1-3 L/ha	56 dni; aplikacija po vzniku plevelov. 56 dni; aplikacija po vzniku plevelov.
Enoletni in večletni ozkolistni pleveli razen enoletne latovke ( <i>Poa annua</i> )	Po vzniku posevka (BBCH 13-39)	kvizalofop-p-etil	Trepach	1,8-2,5 L/ha	110 dni; aplikacija po vzniku plevelov.
			Targa super	1,2 – 2,5 L/ha	60 dni; aplikacija po vzniku plevelov.
			Digator	0,6 L/ha	87 dni; aplikacija po vzniku plevelov.
			Zamzar	1,8-2,5 L/ha	110 dni; aplikacija po vzniku plevelov.
Enoletni in večletni ozkolistni pleveli iz semena in nekatere vrste širokolistnih plevelov	Po vzniku posevka, ko ima pesa več kot 6 listov	dimetenamid-P	Frontier X2	0,7 – 0,8 L/ha	ČU; <b>Prepovedan na VVOI.</b>
Ozkolistni plevel	Po vzniku posevka (BBCH 12-33)	kletodim	Select super	1 – 2,5 L/ha	56 dni; aplikacija po vzniku plevelov.

## 10.13 INTEGRIRANO VARSTVO OLJNIH BUČ PRED BOLEZNIMI IN ŠKODLJIVCI

Opombe: ČU – čas uporabe, VVOI- najožje vodovarstveno območje. Pri sredstvih je potrebno upoštevati varnostni pas do voda – glejte navodila za uporabo!

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	UKREPI	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L ali kg na ha)	KARENCA (dni)	OPOMBE, dovoljeno št. rab
<b>Pepelasta plesen buč</b> <i>(Erysiphe polyphaga)</i> , <b>Kumarična pepelasta</b> <i>(Sphaerotheca</i> <i>fuliginea)</i> , <b>Plesen,</b> <b>pepelovka bučnic</b> <i>(Erysiphe</i> <i>cichoracearum)</i> , pepelovka bučnic <i>(Golovinomyces</i> <i>orontii)</i>		<i>Ampelomyces quisqualis</i> sev AQ10 žveplo	AQ-10  Biotip sulfo 800 SC	35 g/ha  5-7,5 L/ha	1  3	  Manjša uporaba
	<b>Plesen bučnic</b> <i>(Pseudoperonospora cubensis)</i>	<b>Agrotehnični ukrepi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- setev odpornih sort,</li> <li>- zagotoviti zračnost posevka,</li> <li>- upoštevanje širokega kolobarja.</li> </ul>				
<b>Virusi:</b> virus rumenega mozaika bučke ZYMV, virus mozaika kumare CMV, virus mozaika lubenice WMV, newdelhi virus kodravosti listov paradižnika ToLCNDV	<b>Agrotehnični ukrepi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- spremljamo pojav uši in jih po potrebi zatiramo,</li> <li>- čiščenje, razkuževanje orodja in strojev,</li> <li>- zatiranje plevela na in v okolici njive ter odstranitev rastlin, ki kažejo tipične simptome virusov,</li> <li>- uporaba zdravega razmnoževalnega materiala (kakovostno seme).</li> </ul> ToLCNDV spada med karantenske škodljive organizme. V primeru suma na navočnost je treba obvestiti UVHVVR.					

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	UKREPI	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L ali kg na ha)	KARENCA (dni)	OPOMBE, dovoljeno št. rab
<p>Listna pegavost bučnic (<i>Septoria cucurbitacearum</i>)</p> <p>Fuzarijska uvelost in nožna trohnoba buč (<i>Fusarium oxysporium</i> spp., <i>Fusarium solani</i> spp.)</p> <p>Kumarna bakterijska uvelost na bučah (<i>Erwinia tracheiphilla</i>)</p> <p>Bela zrnata gniloba bučnih vrež (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)</p>	<p><b>Agrotehnični ukrepi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uporabljamo razkuženo seme,</li> <li>- ob predsetveni pripravi tal ustvarimo rahlo strukturo,</li> <li>- komposti narejeni iz ostankov stebel paradižnika, paprike, jajčevcev, kumaric in fižola niso primerni za gnojenje buč.</li> </ul>					
<p>Listne uši (Aphididae)</p> <p>Bombaževčeva uš (<i>Aphis gossypii</i>)</p> <p>Črna fižolova uš (<i>Aphis fabae</i>)</p>		flonikamid	Afinto	0,1 kg/ha	3	Uporablja se 2 x v sezoni
			Tepeki		3	
<p>Strune (Elaterridae)</p> <p>talne sovke (<i>Agrotis</i> spp.)</p>	Glej pri koruzi	lambda-cihalotrin	Trika expert	15 kg/ha	ČU	
V vročih in suhih poletjih se lahko občasno prerazmnoži navadna fižolova pršica ( <i>Tetranychus urticae</i> ), na mladih rastlinah pa poškodbe povzročajo tudi bolhači ( <i>Phylotreta</i> sp.).						

#### 10.14 INTEGRIRANO VARSTVO OLJNIH BUČ PRED PLEVELI

##### Integrirano zatiranje plevelov v bučah:

Buče imajo dokaj slabo tekmovalno sposobnost proti plevelom tako v začetku razvoja, kot tudi v drugem delu rastne dobe. So šibek člen kolobarja in lahko pomembno vplivajo k povečanju zapleveljenosti njiv, posebej če dolgo čakamo s spravilom. Osredotočiti se je potrebno na čim večji obseg mehaničnega zatiranja plevelov, tako strojno kot ročno. Preden se odloči za pridelovanje buč moramo njive razpleveliti v drugih poljščinah. Ker se buče seje razmeroma pozno se lahko pred setvijo poslužuje tehnika izčrpavanja zaloga plevelnih semen- izvedba slepe setve. Njivo se na grobo poravna že v začetku aprila. S tem se vzbudi kalitev plevelov. Tri tedne po prvi pripravi se opravi brananje s katerim se prizadene že vznikle plevelve. Nato se njivo pusti pri miru kakšnih 14 dni, nato pa se izvede pravo predsetvena priprava. Seje se nakaljeno seme buč, da čim bolj pospešimo vznik. Zato, da se olajša mehanično zatiranje je treba

uskladiti način setve – sajenja in način uporabe okopalnikov ali drugih orodij za mehanično zatiranje. Pri nas prevladuje sistem setve v enojne vrste. Pri setvi s sejalicami za koruzo so medvrstne razdalje večkratniki razdalje 0,7 m. Takšne razdalje se ujemajo z okopalniki za koruzo, ki se jih nekoliko priredi. Dvovrstna setev je že manj primerna za strojno okopavanje. Možno je enovrstna setev v sistemu šahovnice tako, da se lahko buče okopava v dveh smereh, pravokotno eno na drugo. Ročno zatiranje plevelov v bučah je navadno potrebno in se običajno stroškovno gledano tudi obrestuje.

**Za zatiranje plevelov je v integrirani pridelavi treba izvesti vsaj en ukrep brez kemične aplikacije letno (stepla setev, uporaba česal, okopavanje, termično zatiranje plevelov-plamen, vodna para ipd.) ali aplikacijo herbicidov samo v vrste.**

Opombe: ČU – čas uporabe, VVOI- najozjeje vodovarstveno območje.

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	NAČIN UPORABE	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L ali kg na ha)	KARENCA; OPOMBE
Nekatere vrste ozkolistnega in širokolistnega plevela	Po setvi, pred vznikom buč	klomazon	Centium 36 CS	0,25 L/ha	ČU
Nekater vrste enoletnega širokolistnega plevela	Po setvi, od razvojne faze suhega semena do faze, ko je drugi pravi list na glavnem stebelu v celoti razgrnjen (BBCH 00-12).		Clomate	0,25 L/ha	ČU; Manjša uporaba.
Enoletni in večletni ozkolistni pleveli razen enoletne latovke ( <i>Poa annua</i> )	Buče po vzniku (BBCH 12-14)	fluazifop-p-butil	Fusilade forte	0,8 – 1,3 L/ha	ČU; Manjša uporaba. Po vzniku plevelov.
			Fusilade max	1 – 1,5 L/ha	ČU; Manjša uporaba. Po vzniku plevelov.
Nekatere vrste enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela	Pred setvijo s plitvo vdelavo (inkorporacijo) sredstva na globino 2-5 cm	napropamid	Devrinol 45 FL	2 – 2,5 L/ha	ČU; Manjša uporaba. Omejitve pri sajenju in setvi naslednjih kultur.
			Devrinol 45 FL	2 – 2,5 L/ha	ČU; Manjša uporaba. Omejitve pri sajenju in setvi naslednjih kultur.
Enoletni širokolistni pleveli	Takoj po setvi in pred vznikom buč (BBCH 00) oziroma najpozneje 3 dni po setvi	izoksaben	Flexidor	0,25 L/ha	114 dni; Manjša uporaba. Pred vznikom plevelov.

## 10.15 INTEGRIRANO VARSTVO SONČNIC PRED BOLEZNIMI IN ŠKODLJIVCI

Opombe: ČU – čas uporabe, VVOI- najozje vodovarstveno območje.

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	UKREPI	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L ali kg na ha)	KARENCA (dni)	OPOMBE, dovoljeno št. rab
Bela gniloba ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> )	<b>Agrotehnični ukrep:</b> - smiselno kolobarjenje, da imamo čim daljši presledek med križnicami, metuljnicami in sončnico.	piraklostrobin	Retengo	0,5 – 1 L/ha	21	Zaloge v uporabi do 31.7.2025.
		fluopiram + protiokonazol	Propulse	1,0 L/ha	28	
		mefentriflukonazol	Revyona	1,5 L/ha	ČU	
		<i>Pythium oligandrum</i>	Polyversum	0,1 kg/ha	1 dan oz. čas uporabe oz. način uporabe	
Siva plesen ( <i>Botrytis cinerea</i> )		<i>Trichoderma asperellum</i>	Xilon	10 kg/ha	ČU	
Sončnična rja ( <i>Puccinia helianthi</i> )		<i>Pythium oligandrum</i>	Polyversum	0,1 kg/ha	1 dan oz. ČU oz. način uporabe	
Sončnična plesen ( <i>Plasmopara halstedii</i> )	<b>Agrotehnični ukrep:</b> - setev razkuženega semena. <i>P. halstedii</i> spada med karantenske škodljive organizme. Seme navadne sončnice ne sme biti okuženo s to glivo.					
Siva pegavost in trohnoza stebela sončnic ( <i>Diaporthe (Phomopsis) helianthin</i> )	Fungicidi, ki jih navadno uporabljamo proti beli zrnati gnilobi delujejo tudi proti tej bolezni.	piraklostrobin	Retengo	0,5 – 1 L/ha	21	Zaloge v uporabi do 31.7.2025.
		fluopiram + protiokonazol	Propulse	1,0 L/ha	28	
		mefentriflukonazol	Revyona	1,5 L/ha	ČU	
		<i>Pythium oligandrum</i>	Polyversum	0,1 kg/ha	1 dan oz. ČU oz. način uporabe	

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	UKREPI	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L ali kg na ha)	KARENCA (dni)	OPOMBE, dovoljeno št. rab
Strune ( <i>Agrotis</i> spp.)	<b>Agrotehnični ukrepi:</b> - izogibanje večletnemu travinju kot predposevku, - večkratna obdelava tal, - optimalni roki setve in sajenja.	teflutrin	Force 1,5 G	7 kg/ha	ČU	Tretira se v času setve, tako da se sredstvo skupaj s semenom vnaša v tla.
			Teflix	7 kg/ha	ČU	Tretira se v času setve, tako da se sredstvo skupaj s semenom vnaša v tla.
Talne sovke ( <i>Agrotis</i> spp.) in Strune ( <i>Agrotis</i> spp.)		lambda-cihalotrin	Artimide	0,09 l (na SE enoto)	ČU	Tretiranje semena
			Trika expert	15 kg/ha	ČU	Se uporablja na prostem ob setvi oz. sajenju za zatiranje ličink nekaterih talnih škodljivih organizmov
Goli polži, polži lazarji ( <i>Arion</i> sp.) in slinarji ( <i>Deroceras</i> sp.) ter rjavi polž ( <i>Helix aspersa</i> ) in beli vrtni polž ( <i>Theba pisana</i> )	<b>Agrotehnični ukrepi:</b> - uničevanje plevelov in košnja zarasti, - postavitve vab in mehanično zatiranje, - trošenje apna in pepela v trakovih na mestih prihoda polžev na posevek.	železov (III) fosfat	Ferramol	50 kg/ha	ni potrebna	Sredstvo se enakomerno potrosi po tleh v okolici gojenih rastlin, med vrstami ali ob robovih njiv in gred okoli rastlin.
			Poizomor bio vaba za zatiranje polžev	50 kg/ha	ni potrebna	
			Solabiol proti polžem	50 kg/ha	ni potrebna	
vse vrste lazarjev ( <i>Arion</i> sp.) in slinarjev ( <i>Derocera</i> sp.)		metaldehid	Gusto 3 – Poizomor	6 kg/ha	ČU	Od setve do faze, ko je razvitih devet listov (BBCH 00-19)

## 10.16 INTEGRIRANO VARSTVO SONČNIC PRED PLEVELI

Za zatiranje plevelov je v integrirani pridelavi treba izvesti vsaj en ukrep brez kemične aplikacije letno (slepa setev, uporaba česal, okopavanje, termično zatiranje plevelov-plamen, vodna para ipd.) ali aplikacijo herbicidov samo v vrste.

**Zaradi zelo ozkega nabora pripravkov za zatiranje plevelov v sončnici je zelo pomembna predpriprava zemljišča za setev, da imajo talni herbicidi dobre razmere za delovanje. Trajnih širokolistnih plevelov s talnimi herbicidi ni možno zatreti, zato se jih vsaj delno zatire z okopavanjem ali pa se njihovo razpleveli v predhodnem kolobarjem členu. Pri talnih herbicidih je smotno uporabiti mešanice dveh pripravkov tako, da se pokrije čim širši spekter plevelov. Če se izvede le enkratno okopavanje se z njim ne prične prezgodaj, da se ohrani delovanje talnega herbicidnega filma čim dlje časa.**

Opombe: ČU – čas uporabe, VVOI- najozlje vodovarstveno območje.

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	NAČIN UPORABE	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L ali kg na ha)	KARENCA; OPOMBE
Eneletni ozkolistni in širokolistni pleveli	Pred vznikom sončnic in plevelov	pendimetalin	Stomp Aqua	2,9 L/ha	ČU
			Sharpen 33 EC	3 - 5 L/ha	ČU
			Sharpen plus	2,5 – 4 L/ha	ČU
			Challenge	4 L/ha	90
Eneletni in večletni ozkolistni (graminici)	Po vzniku sončnic in plevelov	s-metolaklor	Challenge 600 PT – v uporabi do 28.01.2025	4 L/ha	90
			Chanon	3 L/ha	ČU
			Dual Gold 960 EC – v uporabi do 23.07.2024	1 -1,3 L/ha	ČU; <b>Prepovedan na VVOI.</b>
			Efica 960 EC – v uporabi do 23.07.2024	1 -1,3 L/ha	ČU; <b>Prepovedan na VVOI.</b>
Eneletni in večletni ozkolistni (graminici)	Po vzniku sončnic in plevelov	metobromuron	Proman	3 L/ha	ČU
			Focus ultra	1 – 4 l / ha <sup>a</sup>	ČU; <sup>a</sup> odvisno od vrste in razvojne faze plevela
			Fusilade forte	0,8 – 2,5l / ha	90
			Fusilade max	1-3 L/ha	90
Eneletni, dvoletni in večletni ozkolistni širokolistni plevel	Pred ali po setvi, pred vznikom posevka	glifosat v obliki izopropilamino soli + glifosat v obliki kalijeve soli	Quick 5 EC	1-2 L/ha	ČU
			Wish top	0,625 – 1,17 L/ha	90
<b>Kemično sušenje rastlin s herbicidi pred spravilom v integrirani pridelavi ni dovoljeno.</b>					

## 10.17 INTEGRIRANO VARSTVO KRMINEGA GRAHA PRED BOLEZNIMI IN ŠKODLJIVCI

Opombe: ČU – čas uporabe, WOI- najpožje vodovarstveno območje. Pri sredstvih je potrebno upoštevati varnostni pas do voda – glej navodila za uporabo!

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	UKREPI	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L ali kg na ha)	KARENCA (dni)	OPOMBE, dovoljeno št. rab
Siva plesen ( <i>Botrytis cinerea</i> )		pirimetanil ciprodinil + fludioksonil pirimetanil	Avalon	1,5 L/ha	28	
			Switch 62,5 WG	1 kg/ha	28	grah za zrnje
			Erune 40 SC	1,5 L/ha	28	
			Laitane	1,5 L/ha	28	
			Pretil	1,5 L/ha	28	
Grahova rja ( <i>Uromyces pisi</i> ), Grahova pepelovka ( <i>Erysiphe pisi</i> ), Grahova pegavost ( <i>Mycosphaerella pinodes</i> ), Grahova plesen ( <i>Peronospora viciae</i> f. sp. <i>pisi</i> ) in Grahova pegavost ( <i>Ascochyta pisi</i> )		<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (former <i>subtilis</i> ) str. QST <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> sev FZB24 azoksistrobin	Serenade ASO	8 L/ha	ni potrebna	grah za zrnje
			Taegro	0,185- 0,37 kg/ha	1	grah za zrnje
			Chamane	1 L/ha	35	
			Mirador 250 SC	1 L/ha	35	Dovoljeni sta največ dve tretiranj v eni rastni dobi v intervalu, ki ne sme biti krajši od 14 dni.
			Nortios	1 L/ha	35	
			Ortiva	1 L/ha	35	
			Zaftra azt 250 SC	1 L/ha	35	
			Zoxis 250 SC	1 L/ha	7	grah za zrnje
			Revus	0,6 L/ha	14	grah za zrnje
			Polyversum	0,1 kg/ha	1 dan oz. ČU oz. način uporabe	grah za zrnje
Grahova plesen ( <i>Peronospora viciae</i> f. sp. <i>pisi</i> )		baker	Univerzalni fungicid	1g/3-4 L vode/100 m <sup>2</sup>	1	grah za zrnje
			Cuprablau Z 35 WG	0,66-1,5 kg/ha	3	grah za zrnje
			Cuprablau Z 50 WP	0,8-1,5 kg/ha	3	grah za zrnje
Pepelovke iz družine		COS-OGA	Cuproxat	5,3 L/ha	3	grah za zrnje
			Fytosave	2 L/ha	ni potrebna	

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	UKREPI	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L ali kg na ha)	KARENCA (dni)	OPOMBE, dovoljeno št. rab	
Erysiphaceae		žveplo	Biotip sulfo 800 SC Cosan Microthiol SC Pepelin Vindex 80 WG	4 – 5 L/ha 4 – 5 kg /ha 5 L/ha 4 – 5 kg /ha 4 – 5 kg /ha	7 7 7 7 7	grah za zrnje grah za zrnje grah za zrnje grah za zrnje grah za zrnje	
<b>Grahova pegavost</b> ( <i>Ascochyta blight</i> )	<b>Agrotehnični ukrepi:</b> - setev zdravega (certificiranega) semena oz. razkuženega semena, - mulčenje in globoko zaoravanje rastlinskih ostankov tako po pobiranju pridelka.	boskalid + piraklostrobin	Signum	1 kg/ha	21	Tretira se od začetka cvetenja v časovnih intervalih 2 - 4 tedne, odvisno od pritiska bolezn. Na istem zemljišču sta dovoljeni 2 tretiranja v eni rastni dobi.	
<b>Listne uši</b> ( <i>Aphididae</i> )		flonikamid	Afinto	0,14 kg/ha	14	grah za zrnje	
			Teppeki	0,14 kg/ha	14	grah za zrnje	
<b>Grahov zavijač</b> ( <i>Cydia nigricana</i> )		lambda-cihalotrin	Karate zeon 5 CS	0,15 L/ha	7	grah za zrnje	
			pirimikarb	Pirimor 50 WG	0,75 kg/ha	14	grah za zrnje
			deltametrin	Decis 100 EC	63 ml/h	7	grah za zrnje
			<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i>	Lepinox plus – grah za zrnje	1 kg/ha	ni potrebna	grah za zrnje
		<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>aizawai</i>	Agree WG	1 kg/ha	ni potrebna	grah za zrnje Odmerek 1 kg/ha (10 g/100 m <sup>2</sup> ) učinkovit na stročnicah, ki niso višje od 50 cm.	

## 10.18 INTEGRIRANO VARSTVO KRMNEGA GRAHA PRED PLEVELI

Opombe: ČU – čas uporabe, WOI- najozje vodovarstveno območje.

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	NAČIN UPORABE	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L ali kg na ha)	KARENCA; OPOMBE
Enoletni ozkolistni in širokolistni pleveli	Po setvi in pred vznikom posevka	klomazon + pendimetalin	Stallion Sync Tec	3 L/ha	ČU
		pendimetalin	Stomp Aqua	2,9 L/ha	ČU
		prosulfokarb	Boxer	5 L/ha	ČU
Enoletni in večletni ozkolistni pleveli	Po vzniku gojenih rastlin	propakvizafop	Agil 100 EC	0,75 – 1,5 L/ha	60
			Zetrola	0,75 – 1,5 L/ha	60
Enoletni in nekateri večletni širokolistni pleveli	Po vzniku plevela	bentazon	Basagran 480	1,5 – 2 L/ha	ČU; <b>Prepoved na WOI.</b>
			Benta 480 SL	2 L/ha	ČU; <b>Prepoved na WOI.</b>
Enoletni širokolistni in ozkolistni plevel	Po setvi in pred vznikom posevka	aklonifen	Chanon	3 L/ha	ČU; grah za zrnje
		klomazon	Clomate	0,25 L/ha	ČU; grah za zrnje
		cikloksidim	Focus ultra	1 – 4 l / ha	56 dni; grah za zrnje
		fluazifop-P-butil	Frequent	2 – 3 L/ha	42 dni; grah za zrnje
			Fusilade super	0,8 – 1,3 L/ha	35 dni; grah za zrnje
			Fusilade max	1,6 L/ha	35 dni; grah za zrnje
			kvizalofop-p-etil	Wish top	0,625-1,17 L/ha

## 10.19 INTEGRIRANO VARSTVO NAVADNE SOJE PRED BOLEZNIMI IN ŠKODLJIVCI

Opombe: ČU – čas uporabe, VVOI- najozje vodovarstveno območje.

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	UKREPI	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L ali kg na ha)	KARENCA (dni)	OPOMBE, dovoljeno št. rab
<b>Bela gniloba</b> ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> )		fluopiram + protiokonazol	Propulse	1 L/ha	28	Tretira se od fenofaze prvih vidnih cvetnih brstih do faze, ko vsi stroki dosežejo končno velikost (BBCH 51-79).
		<i>Trichoderma asperellum</i> T34*	Xilon	10 kg/ha	ČU	
	*Sredstvo se aplicira v vrste, 2-5 cm globoko. Sredstvo se aplicira neposredno za semenom v odprt setveni kanal izključno s sejnalno opremo, ki ima dodatno namesčene aplikatorje za zadelavo (inkorporacijo) mikrogranul na ustrezno globino.					
<b>Siva plesen</b> ( <i>Botryotinia fuckeliana</i> ), <b>bela gniloba</b> ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> )		<i>Bacillus amyloliquifaciens</i> (former <i>subtilis</i> ) str. QST 713	Serenade aso	8 L/ha	ni potrebna	Na istem zemljišču je dovoljenih do šest tretiranj v eni rastni dobi, v razvojnih stadijih od razpiranja listov do začetka mirovanja (BBCH 12-89).
<b>Gosenice škodljivih metuljev</b> ( <i>Lepidoptera</i> spp.)		<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>aizawai</i> <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i>	Agree WG Lepinox plus	1 kg/ha 1 kg/ha	ni potrebna ni potrebna	

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	UKREPI	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L ali kg na ha)	KARENCA (dni)	OPOMBE, dovoljeno št. rab
<b>Pesni bolhač</b> ( <i>Chaetocnema tibialis</i> ), <b>ličinke pokalic – strune</b> ( <i>Agriotes</i> spp.), <b>talne sovke</b> ( <i>Agriotes</i> spp.), <b>cvetna muha</b> ( <i>Hylemya</i> sp.) in <b>druge škodljivje talne žuželke</b>		teflutrin	Force EVO*	12-16 kg/ha	ČU	
<b>Talne sovke</b> ( <i>Agriotes</i> spp.) in <b>strune</b> ( <i>Agriotes</i> spp.).	<b>Agrotehnični ukrepi:</b> - izogibanje večletnemu travinju kot predposevku - večkratna obdelava tal - optimalni roki setve in sajenja. *Sredstvo se odmerja s pomočjo posebnih dozirnih naprav (dozatorjev), ki se jih namesti na sadlinik oziroma na sejalnico.	lambda-cihalotrin	Trika expert*	15 kg/ha	ČU	

#### 10.20 INTEGRIRANO VARSTVO NAVADNE SOJE PRED PLEVELI

Za zatiranje plevelov je v integrirani pridelavi treba izvesti vsaj en ukrep brez kemične aplikacije letno (stepla setev, uporaba česal, okopavanje, termično zatiranje plevelov-plamen, vodna para ipd.) ali aplikacijo herbicidov samo v vrste.

Smernice integriranega varstva pri uravnavanju plevelne populacije se nagibajo k ciljni uporabi herbicidov po vzniku plevelov, a izkušanje iz preučevanja učinkovitosti herbicidov kažejo, da se v naših pridelovalnih razmerah uporabi herbicidov pred vznikom ni mogoče izogniti. Ker soja ne prenaša nižjih temperatur in se jo seje kasneje kot nekatere druge okopavine, je tudi pritisk topljubenih plevelov precejšen. Če se želi preprečiti izgube pridelka, je treba, da je posevek soje približno dva meseca po setvi brez konkurence plevelov. Pri nas v pridelavi soje prevladuje kombinacija uporabe herbicidov pred in po vzniku soje. Talne herbicide se uporabi po setvi soje ter pred vznikom soje in plevelov. Ko imajo rastline razvit 1. do 2. trolist, se opravi aplikacijo herbicidov za zatiranje plevelov po vzniku (največkrat kombinacija herbicida za širokolistne plevelve in graminicida). Mešanice herbicidov dveh ali več različnih aktivnih snovi kažejo večje učinkovitosti kot uporaba samo ene aktivne snovi. Le-te so priporočljive tudi s stališča antirezistenčne strategije.

Opombe: ČU – čas uporabe, VVOI- najzobje vodovarstveno območje. Pri sredstvih je potrebno upoštevati varnostni pas do voda – glejte navodila za uporabo!

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	NAČIN UPORABE	AKTIVNA SNOV	FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO	ODMEREK (L ali kg na ha)	KARENCA; OPOMBE
Enoletni ozkolistni in širokolistni pleveli	Pred vznikom soje in plevelov	pendimetalin	Sharpen 33 EC	3-5 L/ha	ČU
			Sharpen plus	2,5 -4 L/ha	ČU
			Stomp Aqua	2,6 L/ha	ČU
			Dual Gold 960 EC	1 -1,3 L/ha	ČU; Prepovedan na VVOI. Zaloge v uporabi do 23.7.2024.

Enoletni in večletni ozkolistni pleveli	Po vzniku soje in plevelov	Efica 960 EC	1 -1,3 L/ha	ČU; Prepovedan na WOI. Zaloge v uporabi do 23.7.2024.	
			klomazon	0,25 L/ha	ČU; Manjša uporaba
			Clomate	0,25 L/ha	ČU; Manjša uporaba
			metobromuron	3 L/ha	ČU
			aklonifen	3 L/ha	ČU; Manjša uporaba
			cikloksidim	1 – 4 l / ha	56
			bentazon	1,5 – 2 L/ha	ČU; Prepovedan na WOI.
			tifensulfuron-metil	1 kg/ha	ČU; Prepovedan na WOI.
				2x 7,5 g/ha split	ČU; Karenca za sojo, ki je namenjena zeleni krmi, je 14 dni.
				Harmony 50 SX	

## 11. INFO-TOČKA – INTEGRIRANA PRIDELAVA

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  
Dunajska 22  
1000 Ljubljana

### Spletno mesto:

[Portal GOV.SI](https://www.gov.si teme/integrirana-pridelava/) (<https://www.gov.si teme/integrirana-pridelava/>)«